Análise

LCC

2010/2011

Docente: José Joaquim Oliveira

Apontamentos sobre estruturas topológicas em $\mathbb{R}^n$ e sucessões vectoriais

Capítulo 1

Estruturação topológica de $\mathbb{R}^n$

Este é um capítulo de base, onde introduziremos algumas das propriedades ditas *topológicas* do espaço $\mathbb{R}^n$. São propriedades relacionadas com a noção de *proximidade*, que conferem a $\mathbb{R}^n$ a estrutura adequada para introduzir os conceitos de limite e continuidade.

1.1 O espaço vectorial $\mathbb{R}^n$

Para cada $n \in \mathbb{N}$, representa-se por $\mathbb{R}^n$ o produto cartesiano de n conjuntos iguais a $\mathbb{R}$,

$$\mathbb{R}^n = \underbrace{\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \cdots \times \mathbb{R}}_{n \text{ vezes}} \quad (1.1)$$

constituído pelas sequências finitas $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, com $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}$.

Dados $X, Y \in \mathbb{R}^n$, com $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ e $Y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$, tem-se

$$X = Y \quad \text{se e só se} \quad x_1 = y_1, x_2 = y_2, \dots, x_n = y_n. \quad (1.2)$$

Quando munido das operações usuais de *adição* e *multiplicação escalar*, definidas por

$$\begin{aligned} + : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n &\longrightarrow \mathbb{R}^n \\ (X, Y) &\longmapsto X + Y = (x_1 + x_2, \dots, x_n + y_n) \end{aligned} \quad (3a)$$

e

$$\begin{aligned} \cdot : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n &\longrightarrow \mathbb{R}^n \\ (\alpha, X) &\longmapsto \alpha \cdot X = (\alpha x_1, \dots, \alpha x_n) \end{aligned} \quad (3b)$$

respectivamente, $\mathbb{R}^n$ constitui um espaço vectorial real de dimensão n . Por uma questão de simplicidade, escreveremos αX em vez de $\alpha \cdot X$.

Os elementos X de $\mathbb{R}^n$ designam-se por *vetores* e os números reais $x_1, x_2, \dots, x_n$ por *coordenadas* de X . A *base canónica* de $\mathbb{R}^n$ é o conjunto $\mathcal{B} = \{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n\}$ onde

$$\mathbf{e}_1 = (1, 0, 0, \dots, 0), \mathbf{e}_2 = (0, 1, 0, \dots, 0), \dots, \mathbf{e}_n = (0, 0, \dots, 0, 1) \quad (4)$$

Em $\mathbb{R}^n$, o elemento neutro da adição é o vector $\mathbf{0} = (0, 0, \dots, 0)$, designado por *zero*, e dado $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, o seu *simétrico* é o vector $-X = (-x_1, -x_2, \dots, -x_n)$.

1.2 Produto interno, norma e distância

Nesta secção abordaremos três conceitos que nos permitirão avaliar a “posição relativa” de vectores, o “comprimento” de um vector e a “proximidade” entre elementos de $\mathbb{R}^n$.

1.2.1 Produto interno

Um *produto interno* em $\mathbb{R}^n$ é uma aplicação de $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ em $\mathbb{R}$ que a cada par de vectores $X, Y \in \mathbb{R}^n$ faz corresponder um número real $\langle X, Y \rangle$, verificando as seguintes propriedades (axiomas do produto interno)

$$\text{PI1)} \quad \langle X, X \rangle \geq 0, \quad \forall X \in \mathbb{R}^n \quad \text{e} \quad \langle X, X \rangle = 0 \text{ sse } X = \mathbf{0} \quad (5a)$$

$$\text{PI2)} \quad \langle X, Y \rangle = \langle Y, X \rangle, \quad \forall X, Y \in \mathbb{R}^n \quad (5b)$$

$$\text{PI3)} \quad \langle \alpha X, Y \rangle = \alpha \langle X, Y \rangle, \quad \forall X, Y \in \mathbb{R}^n, \quad \forall \alpha \in \mathbb{R} \quad (5c)$$

$$\text{PI4)} \quad \langle X + Z, Y \rangle = \langle X, Y \rangle + \langle Z, Y \rangle, \quad \forall X, Y, Z \in \mathbb{R}^n \quad (5d)$$

O espaço vectorial $\mathbb{R}^n$ munido com um produto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$ diz-se um *espaço euclidiano* e representa-se por $(\mathbb{R}^n, \langle \cdot, \cdot \rangle)$.

Exemplo 1 *Produto interno usual* ou *canónico*, definido por

$$\langle X, Y \rangle = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n, \quad \forall X, Y \in \mathbb{R}^n. \quad (6a)$$

Exemplo 2 Produto interno definido em $\mathbb{R}^2$ por

$$\langle X, Y \rangle = 2x_1 y_1 + 3x_2 y_2, \quad \forall X, Y \in \mathbb{R}^2. \quad (6b)$$

■

Dos axiomas do produto interno, extrai-se facilmente o seguinte resultado.

Propriedade 1 *No espaço euclidiano $(\mathbb{R}^n, \langle \cdot, \cdot \rangle)$, com $\langle \cdot, \cdot \rangle$ um produto interno qualquer, tem-se*

$$\langle \mathbf{0}, X \rangle = \langle X, \mathbf{0} \rangle = 0, \quad \forall X \in \mathbb{R}^n. \quad (7)$$

Demonstração:

Fixemos arbitrariamente $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$. Podemos escrever $\mathbf{0} = 0\mathbf{y}$. Das propriedades (5b,c), vem então

$$\langle X, \mathbf{0} \rangle = \langle \mathbf{0}, X \rangle = \langle 0\mathbf{y}, X \rangle = 0 \langle Y, X \rangle = 0 \quad \blacksquare$$

Num espaço euclidiano pode introduzir-se o conceito de ortogonalidade. Dizemos que dois vectores $X, Y \in \mathbb{R}^n$ são *ortogonais* relativamente a um produto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$, considerado, quando $\langle X, Y \rangle = 0$.

Exemplo 3 Em $\mathbb{R}^2$, munido com o produto interno canónico definido como em (6a), os vectores $U = (1, 1)$ e $V = (-1, 1)$ são ortogonais e os vectores $W = (1, 2)$ e $Z = (3, -1)$ não são ortogonais.

Exemplo 4 Em $\mathbb{R}^2$, munido com o produto interno definido em (6b), $U = (1, 1)$ e $V = (-1, 1)$ não são ortogonais e $W = (1, 2)$ e $Z = (3, -1)$ são ortogonais.

Um resultado importante a que faremos referência frequentemente é o seguinte.

Teorema 1 [Desigualdade de Cauchy-Schwarz]

Consideremos o espaço $\mathbb{R}^n$ munido de um produto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$. Então

$$(a) \quad |\langle X, Y \rangle| \leq \sqrt{\langle X, X \rangle} \sqrt{\langle Y, Y \rangle}, \quad \forall X, Y \in \mathbb{R}^n$$

$$(b) \quad |\langle X, Y \rangle| = \sqrt{\langle X, X \rangle} \sqrt{\langle Y, Y \rangle} \\ \text{se e só se } X = \alpha Y \text{ para algum escalar } \alpha \in \mathbb{R}.$$

Demonstração:

(i) Suponhamos, em primeiro lugar, que $X = \mathbf{0}$.

Pela propriedade (7), sai que $\langle X, Y \rangle = 0$, $\forall Y \in \mathbb{R}^n$, e a condição (a) é verificada como igualdade. A equivalência em (b) é verificada trivialmente com $\alpha = 0$ e $X = \alpha Y$

(ii) Suponhamos agora que $X \neq 0$.

Como $\langle X, X \rangle \neq 0$, podemos considerar o vector (auxiliar) $Z = Y - \frac{\langle X, Y \rangle}{\langle X, X \rangle} X$.

Por (5a), tem-se $\langle Z, Z \rangle \geq 0$. Usando as propriedades do produto interno, tem-se sucessivamente

$$\begin{aligned} \langle Z, Z \rangle \geq 0 &\iff \langle Y - \frac{\langle X, Y \rangle}{\langle X, X \rangle} X, Y - \frac{\langle X, Y \rangle}{\langle X, X \rangle} X \rangle \geq 0 \\ &\iff \langle Y, Y \rangle - 2 \frac{\langle X, Y \rangle}{\langle X, X \rangle} \langle X, Y \rangle + \frac{(\langle X, Y \rangle)^2}{(\langle X, X \rangle)^2} \langle X, X \rangle \geq 0 \\ &\iff \langle Y, Y \rangle - \frac{(\langle X, Y \rangle)^2}{\langle X, X \rangle} \geq 0 \\ &\iff (\langle X, Y \rangle)^2 \leq \langle X, X \rangle \cdot \langle Y, Y \rangle \\ &\iff |\langle X, Y \rangle| \leq \sqrt{\langle X, X \rangle} \sqrt{\langle Y, Y \rangle} \end{aligned}$$

e fica assim demonstrado o resultado de (a).

Para (b), do que acabamos de ver, tem-se sucessivamente

$$\begin{aligned} |\langle X, Y \rangle| = \sqrt{\langle X, X \rangle} \sqrt{\langle Y, Y \rangle} &\iff \langle Z, Z \rangle = 0 \\ &\iff Z = 0 \\ &\iff Y = \frac{\langle X, Y \rangle}{\langle X, X \rangle} X \end{aligned}$$

o que completa a demonstração ($\alpha = \langle X, Y \rangle / \langle X, X \rangle$). ■

1.2.2 Norma

Uma *norma* em $\mathbb{R}^n$ é uma aplicação de $\mathbb{R}^n$ em $\mathbb{R}$ que a cada $X \in \mathbb{R}^n$ faz corresponder um número real $\|X\|$, verificando as seguintes propriedades (axiomas da norma)

$$\mathbf{N1)} \quad \|X\| \geq 0, \quad \forall X \in \mathbb{R}^n \quad \text{e} \quad \|X\| = 0 \text{ sse } X = (0, \dots, 0) \quad (9a)$$

$$\mathbf{N2)} \quad \|\alpha X\| = |\alpha| \|X\|, \quad \forall X, Y \in \mathbb{R}^n, \quad \forall \alpha \in \mathbb{R} \quad (9b)$$

$$\mathbf{N3)} \quad \|X + Y\| \leq \|X\| + \|Y\|, \quad \forall X, Y \in \mathbb{R}^n \quad (\text{desigualdade triangular}) \quad (9c)$$

O espaço vectorial $\mathbb{R}^n$ munido com uma norma $\|\cdot\|$ diz-se um *espaço normado* e representa-se por $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|)$.

Exemplo 5 *Norma euclidiana* ou *norma dois*, definida por

$$\|X\|_2 = \|(x_1, \dots, x_n)\|_2 = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2} \quad (10a)$$

Exemplo 6 *Norma do máximo* ou *norma infinito*, definida por

$$\|X\|_\infty = \|(x_1, \dots, x_n)\|_\infty = \max\{|x_1|, |x_2|, \dots, |x_n|\} \quad (10b)$$

Exemplo 7 *Norma da soma* ou *norma um*, definida por

$$\|X\|_1 = \|(x_1, \dots, x_n)\|_1 = |x_1| + |x_2| + \dots + |x_n| \quad (10c)$$

■

Dos axiomas da norma, deduz-se facilmente o seguinte resultado.

Propriedade 2 *No espaço normado $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|)$, com $\|\cdot\|$ uma norma qualquer, tem-se*

$$\|-X\| = \|X\|, \quad \forall X \in \mathbb{R}^n. \quad (11)$$

Demonstração: Consequência imediata da propriedade (9b). ■

Observações

1. Todo o produto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$ de $\mathbb{R}^n$ induz uma norma $\| \cdot \|$ em $\mathbb{R}^n$, chamada *norma induzida*, que se define pondo, para cada $x \in \mathbb{R}^n$,

$$\| X \| = \sqrt{\langle X, X \rangle}. \quad (12)$$

2. Se considerarmos em $\mathbb{R}^n$ um produto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$, e se for $\| \cdot \|$ a correspondente norma induzida, a **desigualdade de Cauchy-Schwarz** traduz-se por

$$(a) \quad |\langle X, Y \rangle| \leq \| X \| \| Y \|, \quad \forall X, Y \in \mathbb{R}^n$$

$$(b) \quad |\langle X, Y \rangle| = \| X \| \| Y \| \\ \text{se e só se existe } \alpha \in \mathbb{R} \text{ tal que } X = \alpha Y.$$

3. Nas condições da observação 2, tem-se que, dados $X, Y \in \mathbb{R}^n \setminus \{(0, \dots, 0)\}$,

$$\frac{|\langle X, Y \rangle|}{\| X \| \| Y \|} \leq 1,$$

pelo que

$$-1 \leq \frac{\langle X, Y \rangle}{\| X \| \| Y \|} \leq 1. \quad (13a)$$

Podemos então concluir que, dados arbitrariamente $X, Y \in \mathbb{R}^n \setminus \{(0, \dots, 0)\}$, existe um único número real $\theta \in [0, \pi]$ tal que

$$\cos \theta = \frac{\langle X, Y \rangle}{\| X \| \| Y \|} \quad (13b)$$

ou seja, tal que

$$\langle X, Y \rangle = \| X \| \| Y \| \cos \theta \quad (13c)$$

O número real θ designa-se por *ângulo* entre os vectores não nulos X e Y .

4. Dadas duas normas quaisquer em $\mathbb{R}^n$, digamos $\| \cdot \|_*$ e $\| \cdot \|_{\#}$, existem sempre dois números reais positivos, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^+$, tais que

$$\alpha \| X \|_* \leq \| X \|_{\#} \leq \beta \| X \|_*, \quad \forall X \in \mathbb{R}^n, \quad (14)$$

o que se traduz dizendo que em $\mathbb{R}^n$ quaisquer duas normas são *equivalentes*.

A equivalência entre normas garante que todos os conceitos e resultados de $\mathbb{R}^n$ relacionados com a noção de proximidade e que, em geral, são definidos em termos de uma norma, serão válidos independentemente da norma considerada. Por esta razão, usaremos indiferentemente as normas $\| \cdot \|_2$, $\| \cdot \|_{\infty}$ e $\| \cdot \|_1$ quando falarmos de limite, continuidade, etc.. ■

1.2.3 Distância

Uma *distância* em $\mathbb{R}^n$ é uma aplicação de $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ em $\mathbb{R}$ que a cada par de vectores $X, Y \in \mathbb{R}^n$ faz corresponder um número real $d(X, Y)$, verificando as seguintes propriedades (axiomas da distância)

$$\mathbf{D1)} \quad d(X, Y) \geq 0, \quad \forall X, Y \in \mathbb{R}^n, \quad \text{e} \quad d(X, Y) = 0 \quad \text{se e só se} \quad X = Y \quad (15a)$$

$$\mathbf{D2)} \quad d(X, Y) = d(Y, X), \quad \forall X, Y \in \mathbb{R}^n \quad (15b)$$

$$\mathbf{D3)} \quad d(X, Y) \leq d(X, Z) + d(Z, Y), \quad \forall X, Y, Z \in \mathbb{R}^n \quad (\text{desigualdade triangular}) \quad (15c)$$

O espaço vectorial $\mathbb{R}^n$ munido de uma distância d diz-se um *espaço métrico* e representa-se por $(\mathbb{R}^n, d)$.

Exemplo 8 *Distância euclidiana* definida por

$$d_2(X, Y) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2 + \cdots + (x_n - y_n)^2}, \quad (16a)$$

com $X = (x_1, \dots, x_n)$, $Y = (y_1, \dots, y_n)$.

Exemplo 9 *Distância discreta* definida por

$$d_{0,1}(X, Y) = \begin{cases} 0 & \text{se } X = Y \\ 1 & \text{se } X \neq Y \end{cases} \quad (16b)$$

■

Observações

1. Toda a norma $\|\cdot\|$ de $\mathbb{R}^n$ induz uma distância d em $\mathbb{R}^n$, definida por

$$d(X, Y) = \|X - Y\|, \quad \forall X, Y \in \mathbb{R}^n. \quad (17a)$$

2. Da observação anterior, sai que todo o produto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$ de $\mathbb{R}^n$ dá origem a uma distância d em $\mathbb{R}^n$, definida por

$$d(X, Y) = \sqrt{\langle X - Y, X - Y \rangle}, \quad \forall X, Y \in \mathbb{R}^n. \quad (17b)$$

3. Para além da distância euclidiana introduzida em (16a), também resultam de uma norma, por exemplo, a *distância do máximo*

$$d_\infty(X, Y) = \|X - Y\|_\infty = \max\{|x_1 - y_1|, |x_2 - y_2|, \dots, |x_n - y_n|\}, \quad (18a)$$

com $X = (x_1, \dots, x_n)$, $Y = (y_1, \dots, y_n)$.

e a *distância da soma* (ou Pombalina)

$$d_1(X, Y) = \|X - Y\|_1 = |x_1 - y_1| + |x_2 - y_2| + \dots + |x_n - y_n|, \quad (18b)$$

com $X = (x_1, \dots, x_n)$, $Y = (y_1, \dots, y_n)$. ■

Exercícios

1. Seja $f: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ a aplicação definida por $f(x, y) = xy$. Mostre que f é um produto interno em $\mathbb{R}$.
2. Seja $\langle \cdot, \cdot \rangle$ um produto interno definido em $\mathbb{R}^n$.

(a) Mostre que a norma induzida

$$\begin{aligned} \|\cdot\|: \mathbb{R}^n &\rightarrow \mathbb{R} \\ X &\mapsto \sqrt{\langle X, X \rangle} \end{aligned}$$

é de facto uma norma em $\mathbb{R}^n$;

(b) Determine a norma em $\mathbb{R}^n$ induzida pelo produto interno canónico.

3. Considere a aplicação $h: \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $h((x_1, x_2), (y_1, y_2)) = 2x_1y_1 + 3x_2y_2$.

(a) Verifique que h é um produto interno em $\mathbb{R}^2$;

(b) Determine a norma em $\mathbb{R}^2$ induzida pelo produto interno apresentado.

4. Mostre que $g: \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $g(X, Y) = 2x_1y_1 + x_1y_2 + x_2y_1 + 3x_2y_2 - x_1y_3 - x_3y_1 + x_3y_3$, para quaisquer $X = (x_1, x_2, x_3)$ e $Y = (y_1, y_2, y_3)$ em $\mathbb{R}^3$, define um produto interno em $\mathbb{R}^3$.
5. Verifique que, em $\mathbb{R}^3$ munido com o produto interno canónico, os vectores $e_1 = (1, 0, 0)$, $e_2 = (0, 1, 0)$ e $e_3 = (0, 0, 1)$ são ortogonais dois a dois.
6. Determine os vectores de $\mathbb{R}^3$ que, relativamente ao produto interno canónico, são ortogonais ao vector $U = (1, 1, 1)$.

7. Considere o produto interno definido em $\mathbb{R}^2$ por

$$\langle X, Y \rangle = 2x_1y_1 + x_1y_2 + x_2y_1 + 3x_2y_2, \quad X = (x_1, x_2), \quad Y = (y_1, y_2).$$

(a) Sejam $U = (-1, 0)$, $V = (0, 2)$. Calcule $\langle U, U \rangle$, $\langle V, V \rangle$, $\langle U, V \rangle$, $\langle U + 2V, -2U + 3V \rangle$.

(b) Apresente $W, Z \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ que sejam ortogonais relativamente a $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

8. Considere as aplicações de $\mathbb{R}^n$ em $\mathbb{R}$ definidas por

$$\begin{aligned} \|X\|_2 &= \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}, \\ \|X\|_\infty &= \max\{|x_1|, |x_2|, \dots, |x_n|\}, \\ \|X\|_1 &= |x_1| + |x_2| + \dots + |x_n|, \end{aligned}$$

para qualquer $X = (x_1, \dots, x_n)$ em $\mathbb{R}^n$. Prove que estas aplicações são normas em $\mathbb{R}^n$.

9. Considere o espaço $\mathbb{R}^3$ munido separadamente das normas $\|\cdot\|_2$, $\|\cdot\|_\infty$ e $\|\cdot\|_1$ definidas para $n = 3$. Em cada caso, calcule a correspondente norma do vectores $U = (0, 0, 1)$, $V = (1, 2, 3)$ e $W = (-4, 0, 5)$.

10. Considere as normas $\|\cdot\|_2$, $\|\cdot\|_\infty$ e $\|\cdot\|_1$ definidas no exercício 8.

(a) Para $n = 2$, esboce as correspondentes bolas $B((0, 0), 1)$.

(b) Considere $n = 3$. Mostre que, para cada $X \in \mathbb{R}^3$, se tem

$$\|X\|_\infty \leq \|X\|_2 \leq \|X\|_1 \leq 3 \|X\|_\infty, \quad \forall X \in \mathbb{R}^3.$$

11. Sejam $\langle \cdot, \cdot \rangle$ um produto interno em $\mathbb{R}^n$ e $\|\cdot\|$ a correspondente norma induzida. Mostre que:

(a) $\|X + Y\|^2 + \|X - Y\|^2 = 2\|X\|^2 + 2\|Y\|^2, \quad \forall X, Y \in \mathbb{R}^n;$

(b) $\|X + Y\| \|X - Y\| \leq \|X\|^2 + \|Y\|^2, \quad \forall X, Y \in \mathbb{R}^n;$

(c) $\langle X + Y, X - Y \rangle = 0$ se e só se $\|X\| = \|Y\|;$

(d) $\|X + \lambda Y\| \geq \|X\|, \quad \forall \lambda \in \mathbb{R},$ se e só se $\langle X, Y \rangle = 0.$

12. Seja $d_{0,1} : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ definida por $d(X, Y) = 0$ se $X = Y$ e $d(X, Y) = 1$ se $X \neq Y$.
- (a) Mostre que $d_{0,1}$ é uma distância em $\mathbb{R}^2$.
- (b) Esboce ou especifique cada um dos conjuntos
$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : d_{0,1}((x, y), (0, 0)) < k\},$$
onde k assume, alternativamente, os valores $\frac{1}{2}, 1, 2$.
13. Determine a norma e a distância induzidas em $\mathbb{R}^n$ pelo produto interno canônico.
14. Determine a distância induzida em $\mathbb{R}^n$ pela:
- (a) norma do máximo, isto é, pela norma $\|(x_1, \dots, x_n)\|_\infty = \max\{|x_1|, \dots, |x_n|\}$;
- (b) norma da soma, isto é, pela norma $\|(x_1, \dots, x_n)\|_1 = |x_1| + \dots + |x_n|$.
15. Represente geometricamente a bola $B((2, 1), 2)$ quando em $\mathbb{R}^2$ se considera:
- (a) a métrica induzida pela norma euclidiana, $(x, y) \mapsto \|(x, y)\|_2$;
- (b) a métrica induzida pela norma do máximo, $(x, y) \mapsto \|(x, y)\|_\infty$;
- (c) a norma da soma; $(x, y) \mapsto \|(x, y)\|_1$.

1.3 Algumas noções topológicas

Os conceitos que passaremos a introduzir nesta secção estão fortemente relacionados com a noção de norma. Assim, passaremos a considerar o espaço $\mathbb{R}^n$ munido de uma norma $\| \cdot \|$ e representaremos por d a correspondente distância induzida.

1.3.1 Bola no espaço $\mathbb{R}^n$

Sejam $A \in \mathbb{R}^n$ e $r \in \mathbb{R}^+$. Chama-se *bola* de centro A e raio r ao conjunto

$$B(A, r) = \{ X \in \mathbb{R}^n : \| X - A \| < r \} = \{ X \in \mathbb{R}^n : d(X, A) < r \} \quad (19)$$

Figura 1: Bola em $\mathbb{R}^2$ segundo as normas $\| \cdot \|_2$, $\| \cdot \|_\infty$ e $\| \cdot \|_1$, respectivamente.

Observação

O conceito de *bola* estende a $\mathbb{R}^n$, $n \geq 2$, a noção de intervalo aberto limitado.

1.3.2 Conjunto aberto

Consideremos um conjunto $A \subseteq \mathbb{R}^n$ e seja X um ponto de A .

Dizemos que X é *ponto interior* de A quando

$$\exists r > 0 : B(X, r) \subseteq A \quad (20)$$

Designamos por *interior de A* o conjunto $int(A)$ constituído por todos os pontos interiores a A .

É imediato que $int(A) \subseteq A$.

Exemplo 10

- (a) Se $A =]1, 2] \times [-1, 0[$ então $\text{int}(A) =]1, 2[\times]-1, 0[$.
- (b) Se $B =]1, 2] \times ([-1, 0[\cap \mathbb{Q})$ então $\text{int}(B) = \emptyset$, porque toda a bola com centro em algum ponto de B contém pontos de ordenada irracional.
- (c) Se $C = \left\{ \left(\frac{1}{n}, 1 \right) : n \in \mathbb{N} \right\}$ então $\text{int}(C) = \emptyset$.
- (d) Se $D = \{1, 2\} \times \mathbb{R}$ então $\text{int}(D) = \emptyset$.
- (e) Se $E = \mathbb{R}^2$ então $\text{int}(E) = \mathbb{R}^2$. ■

Um conjunto $A \subseteq \mathbb{R}^n$ diz-se *aberto* quando $\text{int}(A) = A$.

Exemplo 11

- (a) Para quaisquer $A \in \mathbb{R}^n$ e $r \in \mathbb{R}^+$, a bola $B(A, r)$ é um aberto.
- (b) $A =]1, 2[\times]-1, 0[$ é aberto e $B =]1, 2[\times (]-1, 0[\cap \mathbb{Q})$ não é aberto.
- (c) $C = \left\{ \left(\frac{1}{n}, 1 \right) : n \in \mathbb{N} \right\}$ não é aberto.
- (d) $E = \mathbb{R}^2$ é aberto. ■

1.3.3 Conjunto fronteira

Sejam $A \subseteq \mathbb{R}^n$ e $X \in \mathbb{R}^n$.

Dizemos que X é *ponto fronteiro* de A quando qualquer bola de centro em X contém pontos em A e no seu complementar $\mathbb{R}^n \setminus A$, ou seja, quando

$$\forall r > 0, \quad B(X, r) \cap A \neq \emptyset \quad \text{e} \quad B(X, r) \cap (\mathbb{R}^n \setminus A) \neq \emptyset. \quad (21)$$

Designamos por *fronteira* de A o conjunto $\text{fr}(A)$ constituído por todos os pontos fronteiros de A .

Exemplo 12

- (a) Se $A =]1, 2] \times [-1, 0[$ então $\text{fr}(A) = [1, 2] \times \{-1, 0\} \cup \{1, 2\} \times [-1, 0]$.
- (b) Se $B =]1, 2] \times ([-1, 0[\cap \mathbb{Q})$ então $\text{fr}(B) = [1, 2] \times [-1, 0]$, porque toda a bola com centro em algum ponto de $[1, 2] \times [-1, 0]$ contém pontos de ordenada irracional e pontos de ordenada racional.

- (c) Se $C = \left\{ \left(\frac{1}{n}, 1 \right) : n \in \mathbb{N} \right\}$ então $fr(C) = C \cup \{(0, 1)\}$.
- (d) Se $D = \{1, 2\} \times \mathbb{R}$ então $fr(D) = D$.
- (e) Se $E = \mathbb{R}^2$ então $fr(E) = \emptyset$. ■

1.3.4 Conjunto fechado

Sejam $A \subseteq \mathbb{R}^n$ e $X \in \mathbb{R}^n$.

Dizemos que X é *ponto aderente* ao conjunto A quando existem pontos de A arbitrariamente próximos de X (independentemente de X ser ponto de A ou não), isto é, quando

$$\forall r > 0, B(X, r) \cap A \neq \emptyset \quad (22)$$

Designa-se por *aderência* de A , ou *fecho* de A , o conjunto $\overline{A}$ constituído por todos os pontos aderentes a A .

É imediato que $A \subseteq \overline{A}$.

Exemplo 13

- (a) Se $A =]1, 2] \times [-1, 0[$ então $\overline{A} = [1, 2] \times [-1, 0]$.
- (b) Se $B =]1, 2] \times ([-1, 0[\cap \mathbb{Q})$ então $\overline{B} = [1, 2] \times [-1, 0]$.
- (c) Se $C = \left\{ \left(\frac{1}{n}, 1 \right) : n \in \mathbb{N} \right\}$ então $\overline{C} = C \cup \{(0, 1)\}$.
- (d) Se $D = \{1, 2\} \times \mathbb{R}$ então $\overline{D} = D$.
- (e) Se $E = \mathbb{R}^2$ então $\overline{E} = \mathbb{R}^2$. ■

Um conjunto $A \subseteq \mathbb{R}^n$ diz-se *fechado* quando $\overline{A} = A$.

Exemplo 14

- (a) $A = [1, 2] \times [-1, 0]$ é fechado.
- (b) $C = \left\{ \left(\frac{1}{n}, 1 \right) : n \in \mathbb{N} \right\}$ não é fechado.
- (c) $E = \mathbb{R}^2$ é fechado. ■

Propriedade 3 Seja A um subconjunto de $\mathbb{R}^n$. Então:

(a) $int(A) \subseteq A$, $fr(A) = fr(\mathbb{R}^n \setminus A)$, $fr(A) \subseteq \overline{A}$, $A \subseteq \overline{A}$;

(b) $\overline{A} = fr(A) \cup int(A)$; (reunião disjunta)

(c) $int(\mathbb{R}^n \setminus A) = \mathbb{R}^n \setminus \overline{A}$;

(d) $\overline{\mathbb{R}^n \setminus A} = \mathbb{R}^n \setminus int(A)$.

Demonstração:

Os resultados de (a) são consequência imediata das definições.

Para (b), basta mostrar que $\overline{A} \subseteq fr(A) \cup int(A)$. A inclusão contrária ($\supseteq$) é consequência de (a).

Seja $X \in \overline{A}$. Então $\forall r > 0$, $B(X, r) \cap A \neq \emptyset$.

- No caso em que existe $r^* > 0$ tal que $B(X, r^*) \subseteq A$, conclui-se que $X \in int(A)$.
- Caso contrário, conclui-se ainda que $\forall r > 0 : B(X, r) \cap (\mathbb{R}^n \setminus A) \neq \emptyset$, pelo que $X \in fr(A)$.

Para (c), atenda-se a que

$$\begin{aligned} X \in int(\mathbb{R}^n \setminus A) &\iff \exists r > 0 : B(X, r) \subset (\mathbb{R}^n \setminus A) \\ &\iff \exists r > 0 : B(X, r) \cap A = \emptyset \\ &\iff X \notin \overline{A} \\ &\iff X \in \mathbb{R}^n \setminus \overline{A} \end{aligned}$$

Para (d), atenda-se a que

$$\begin{aligned} X \in \mathbb{R}^n \setminus int(A) &\iff X \notin int(A) \\ &\iff \forall r > 0 : B(X, r) \not\subset A \\ &\iff \forall r > 0 : B(X, r) \cap (\mathbb{R}^n \setminus A) \neq \emptyset \\ &\iff X \in \overline{\mathbb{R}^n \setminus A} \end{aligned}$$

■

Teorema 2

Um conjunto $A \subseteq \mathbb{R}^n$ é fechado(aberto) se e só se o seu complementar $\mathbb{R}^n \setminus A$ é aberto(fechado).

Demonstração: Pelas definições de conjunto fechado e aberto e pela alínea (c) da propriedade anterior, conclui-se que

$$\begin{aligned} A \text{ é fechado} &\iff A = \overline{A} \\ &\iff \mathbb{R}^n \setminus A = \mathbb{R}^n \setminus \overline{A} \\ &\iff \mathbb{R}^n \setminus A = int(\mathbb{R}^n \setminus A) \\ &\iff \mathbb{R}^n \setminus A \text{ é aberto.} \end{aligned}$$

■

Teorema 3 *São válidas as seguintes propriedades:*

1. Se $A, B \subseteq \mathbb{R}^n$ são abertos, então $A \cap B$ é aberto;
2. Se $A, B \subseteq \mathbb{R}^n$ são fechados, então $A \cup B$ é fechado;
3. Se $(A_i)_{i \in I}$ é uma família de abertos, então $\bigcup_{i \in I} A_i$ é aberto;
4. Se $(A_i)_{i \in I}$ é uma família de fechados, então $\bigcap_{i \in I} A_i$ é fechado.

Demonstração:

1. Sejam $A, B \subseteq \mathbb{R}^n$ abertos.

Mostremos que $A \cap B \subseteq \text{int}(A \cap B)$, pois a inclusão ($\supseteq$) é trivial.

Seja $X \in A \cap B$. Então $X \in A$ e $X \in B$. Como A e B são abertos, $X \in \text{int}(A)$ e $X \in \text{int}(B)$, pelo que, existem $r_1 > 0$ e $r_2 > 0$ tais que $B(X, r_1) \subseteq A$ e $B(X, r_2) \subseteq B$. Tomando $r = \min\{r_1, r_2\}$, tem-se que $B(X, r) \subseteq B(X, r_1) \subseteq A$ e $B(X, r) \subseteq B(X, r_2) \subseteq B$, donde $B(X, r) \subseteq A \cap B$ e $X \in \text{int}(A \cap B)$;

2. Este ponto é consequência do ponto 1. e do Teorema 2. Com efeito,

$$\begin{aligned} A, B \text{ são fechados} &\Rightarrow \mathbb{R}^n \setminus A, \mathbb{R}^n \setminus B \text{ são abertos} \\ &\Rightarrow (\mathbb{R}^n \setminus A) \cap (\mathbb{R}^n \setminus B) \text{ é aberto} \\ &\Leftrightarrow \mathbb{R}^n \setminus (A \cup B) \text{ é aberto} \\ &\Leftrightarrow A \cup B \text{ é fechado.} \end{aligned}$$

3. Seja $(A_i)_{i \in I}$ uma família arbitrária de abertos.

Mostremos que $\bigcup_{i \in I} A_i \subseteq \text{int}(\bigcup_{i \in I} A_i)$, pois a inclusão ($\supseteq$) é trivial.

Seja $X \in \bigcup_{i \in I} A_i$. Então $X \in A_k$ para algum $k \in I$. Como A_k é aberto, então $X \in \text{int}(A_k)$, existindo $r > 0$ tal que $B(X, r) \subseteq A_k \subseteq \bigcup_{i \in I} A_i$. Logo $X \in \text{int}(\bigcup_{i \in I} A_i)$.

4. Analogamente ao ponto 2., este ponto é consequência do ponto 3. e do Teorema 2. ■

Observações

1. Há conjuntos que não são abertos nem fechados. Por exemplo, $A = [0, 1[\times]0, 2]$;
2. Há conjuntos que são, simultaneamente, abertos e fechados. Os únicos exemplos são $\emptyset$ e $\mathbb{R}^n$ (repare-se que, $A \subseteq \mathbb{R}^n$ é simultaneamente aberto e fechado se e só se $\text{int}(A) = \bar{A}$ se e só se $fr(A) = \emptyset$, pela Propriedade 3, alínea (b));
3. A intersecção infinita de abertos pode não ser um aberto.

Por exemplo, para cada $n \in \mathbb{N}$, o conjunto $A_n = \left] -\frac{1}{n}, \frac{1}{n} \right[\times]1, 2[$ é um aberto em $\mathbb{R}^2$.

No entanto, $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n = \{0\} \times]1, 2[$ não é um aberto em $\mathbb{R}^2$;

4. A reunião infinita de fechados pode não ser um fechado.

Por exemplo, o conjunto $B =]0, 1[\times]0, 1[$, não é um fechado em $\mathbb{R}^2$.

No entanto, $B = \bigcup_{X \in B} \{X\}$, sendo cada $\{X\}$ um conjunto fechado em $\mathbb{R}^2$;

5. Para todo o conjunto $A \subseteq \mathbb{R}^n$, tem-se que $\text{int}(A)$ é aberto e $\overline{A}$ é fechado;

6. Se $A \subseteq B$; então $\text{int}(A) \subseteq \text{int}(B)$ e $\overline{A} \subseteq \overline{B}$;

7. $\text{int}(A \cap B) = \text{int}(A) \cap \text{int}(B)$, $\text{int}(A \cup B) \supseteq \text{int}(A) \cup \text{int}(B)$;

8. $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$, $\overline{A \cap B} \subseteq \overline{A} \cap \overline{B}$. ■

1.3.5 Conjunto Derivado

Sejam $A \subseteq \mathbb{R}^n$ e $X \in \mathbb{R}^n$.

Dizemos que X é *ponto de acumulação* do conjunto A quando existem pontos de A , distintos de X , arbitrariamente próximos do ponto X , ou seja, quando

$$\forall r > 0 : (B(X, r) \setminus \{X\}) \cap A \neq \emptyset. \quad (23)$$

Designa-se por *derivado* de A o conjunto A' constituído por todos os pontos de acumulação de A .

Um ponto $X \in A$ diz-se um *ponto isolado* de A quando X não é ponto de acumulação de A , ou seja, quando

$$\exists r > 0 : B(X, r) \cap A = \{X\} \quad (24)$$

Exemplos

(a) Se $A = [0, 1[\times [0, 1[\cup \{(1, 1), (2, 2)\}$ então $A' = [0, 1] \times [0, 1]$ e $(2, 2)$ é o único ponto isolado de A .

(b) Se $B = \left\{ \left(\frac{1}{n}, 1 \right) : n \in \mathbb{N} \right\}$ então $B' = \{(0, 1)\}$ e todos os pontos de B são isolados.

(c) Se $C = \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ então $C' = \emptyset$ e todos os pontos de C são isolados.

(d) Se $D = \{(q, 1) : q \in \mathbb{Q}\}$ então $D' = \mathbb{R} \times \{1\}$ e D não possui pontos isolados. ■

Propriedade 4 *Seja $A \subseteq \mathbb{R}^n$. Então:*

(a) $\bar{A} = A \cup A'$.

(b) $A \subseteq \mathbb{R}^n$ é fechado se e só se $A' \subseteq A$.

Demonstração:

Para (a), a inclusão no sentido recíproco é imediata a partir das definições.

Mostremos então que se $X \in \bar{A}$ mas $X \notin A$ então $X \in A'$.

Seja $X \in \bar{A} \setminus A$. Logo

$$\forall r > 0 : B(X, r) \cap A \neq \emptyset \quad \wedge \quad X \notin A$$

pelo que

$$\forall r > 0, \exists Y \in B(X, r) \cap A \quad \wedge \quad Y \neq X$$

donde

$$\forall r > 0, (B(X, r) \setminus \{X\}) \cap A \neq \emptyset$$

que equivale a dizer que $X \in A'$.

O ponto (b) surge como uma consequência do ponto (a). Deixo como exercício a formalização do raciocínio. ■

1.3.6 Conjunto compacto

Seja $A \subseteq \mathbb{R}^n$.

Dizemos que A é um conjunto *limitado* quando existe uma bola que contém A ou seja, quando

$$\exists X \in \mathbb{R}^n, \exists r \in \mathbb{R}^+ : A \subseteq B(X, r). \quad (25a)$$

Uma vez que é sempre possível escolher $X = (0, \dots, 0) \in \mathbb{R}^n$, A será *limitado* quando

$$\exists r \in \mathbb{R}^+ : A \subseteq B((0, \dots, 0), r). \quad (25b)$$

ou equivalentemente quando

$$\exists r \in \mathbb{R}^+ : \forall X \in A, \|X\| \leq r \quad (25c)$$

Dizemos que A é um conjunto *compacto* se A é simultaneamente fechado e limitado.

Exemplos

- $\mathbb{R}^n$ não é compacto porque não é limitado.
 $\emptyset$ é compacto;
- $A =]0, 1] \times [0, 1]$ e $B = [0, +\infty[\times \{2\}$ não são compactos
(A é limitado mas não é fechado; B é fechado mas não é limitado.);
- $E = [0, 1] \times [0, 1]$ e $F = ([0, 1] \cup \{5\}) \times \{3\}$ são compactos. ■

Exercícios

- Considerando em $\mathbb{R}^2$ a distância euclidiana, determine o *interior*, a *aderência*, a *fronteira* e o *derivado* de cada um dos seguintes subconjuntos de $\mathbb{R}^2$:

$$A =]0, 2[\times]1, 3[$$

$$G = [0, 2] \times (\mathbb{Q} \cap [3, 4])$$

$$B = [0, 2] \times [1, 3]$$

$$H = \left\{ \left(\frac{1}{n}, 1 \right) : n \in \mathbb{N} \right\}$$

$$C = [0, 2] \times]1, 3[$$

$$I = \left\{ \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N} \right\} \times [1, 2]$$

$$D =]0, 2[\times \{3, 4\}$$

$$J = \{ (x, y) : x > y^2 \}$$

$$E = [0, 2] \times \mathbb{R}$$

$$L = B((0, 0), 1)$$

$$F = \mathbb{N} \times \mathbb{N}$$

$$M = \{ (x, y) : 0 \leq x \leq 1 \wedge 0 < y \leq x \}$$

- Considere o espaço vectorial $\mathbb{R}^2$ munido da norma euclidiana.

(a) Apresente conjuntos $A, B \subseteq \mathbb{R}^2$ tais que A seja limitado e B não seja limitado.

(b) Diga se cada um dos seguintes conjuntos é ou não limitado.

$$A = \{ (x, y) : 0 \leq x < 1, 0 \leq y \leq 3 \}$$

$$B = \left\{ (x, y) : \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} < 1 \right\}$$

$$C = \{ (x, y) : x \leq 10, 0 \leq y \leq e^x \}$$

$$D = \left\{ (x, y) : x = \operatorname{sen} a, y = \operatorname{tg} a, \frac{\pi}{4} \leq a < \frac{\pi}{2} \right\}$$

$$E = \{ (x, y) : x \leq y \}$$

$$F = \{ (x, y) : x = 1, -1 \leq y \leq 1 \}$$

$$G = \{ (1, n) : n \in \mathbb{N} \}$$

$$H = \left\{ \left(1, \frac{1}{n} \right) : n \in \mathbb{N} \right\}$$

$$I = ([0, 2] \cap \mathbb{Q}) \times ([-1, 2] \cap \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q})$$

3. Em $\mathbb{R}^2$, apresente:
- (a) uma família de abertos cuja intersecção não seja um aberto;
 - (b) uma família de fechados cuja reunião não seja um fechado.
4. Quando possível, apresente um subconjunto A de $\mathbb{R}^2$ que:
- (a) não seja aberto nem fechado;
 - (b) seja simultaneamente aberto e fechado;
 - (c) seja aberto e limitado;
 - (d) seja fechado e não limitado;
 - (e) seja finito e não limitado;
 - (f) coincida com o seu derivado;
 - (g) coincida com a sua fronteira;
 - (h) cuja fronteira seja o conjunto vazio.
5. Diga, justificando, se cada uma das seguintes afirmações é verdadeira ou falsa:
- (a) se $A \subseteq \mathbb{R}^2$ é aberto então A não é limitado;
 - (b) se $A \subseteq \mathbb{R}^2$ é aberto e $B \subseteq \mathbb{R}^2$ é fechado então $A \cup B$ não é aberto nem fechado;
 - (c) se $A \subseteq \mathbb{R}^2$ é aberto e $x \in A$ então $A \setminus \{x\}$ é aberto;
 - (d) se $A \subseteq B \subseteq \mathbb{R}^2$ e B é fechado então A é fechado;
 - (e) se $A \subseteq B \subseteq \mathbb{R}^2$ e B é fechado então $\bar{A} \subseteq B$;
 - (f) se $F \subseteq \mathbb{R}^2$ é fechado e $A \subseteq \mathbb{R}^2$ é aberto então $F \setminus A$ é fechado;
 - (g) $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ é aberto;
 - (h) $\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in A \}$, com A aberto de $\mathbb{R}$, é aberto;
 - (i) se $A \subseteq \mathbb{R}$ não é aberto então A é fechado;

6. Diga quais dos seguintes subconjuntos de $\mathbb{R}^2$ são compactos:

$$A = \{(x, y) : x \geq 0\}$$

$$B = \{(x, y) : x = \sin a, y = \cos a, 0 \leq a \leq \pi/2\}$$

$$C = \{(x, y) : x^2 + y^2 < 1\}$$

$$D = \{(x, y) : xy > 1\} \cap \{(x, y) : x^2 + y^2 < 4\}$$

$$E = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 1\}$$

$$F = \{(x, y) : \log x \leq y \leq e^x\}$$

$$G \subseteq \mathbb{R}^2, G \text{ finito}$$

$$H = \{(x, y) : x = 1/n, n \in \mathbb{N}, 1 \leq y \leq 3\}$$

$$I = \{(x, y) : x \leq y \leq 4\}$$

$$J = \{(x, y) : x = 0, y \in [0, 1]\}$$

$$L \subset [0, 2[\times]1, 3[, L \text{ fechado}$$

$$M = \{(x, y) : |x| + |y| \leq 1\}$$

Capítulo 2

Sucessões em $\mathbb{R}^m$

Neste capítulo faremos uma extensão breve das principais propriedades das sucessões de números reais às sucessões de elementos do espaço $\mathbb{R}^m$. O estudo desenvolvido neste capítulo será útil nos capítulos seguintes, nomeadamente quando introduzirmos a noção de limite no contexto das funções de várias variáveis. Em todo o capítulo, iremos considerar o espaço $\mathbb{R}^m$ munido de uma norma $\|\cdot\|$.

2.1 Sucessão; subsucessão; sucessão componente

Uma *sucessão* em $\mathbb{R}^m$, *i.e.* uma sucessão de elementos de $\mathbb{R}^m$, é uma aplicação u de domínio $\mathbb{N}$ com valores em $\mathbb{R}^m$

$$\begin{aligned} u : \mathbb{N} &\longrightarrow \mathbb{R}^m \\ n &\longmapsto u(n) = u_n \end{aligned} \tag{1}$$

que a cada $n \in \mathbb{N}$ faz corresponder um único elemento $u_n \in \mathbb{R}^m$. A imagem por u do genérico n designa-se por *termo de ordem n* ou *termo geral* da sucessão. Cada termo u_n da sucessão é um elemento de $\mathbb{R}^m$, possuindo assim m coordenadas, digamos

$$u_n = (u_{1n}, u_{2n}, \dots, u_{mn}), \quad \text{para cada } n \in \mathbb{N}. \tag{2}$$

Para indicar a sucessão u , usaremos as notações

$$(u_n)_{n \in \mathbb{N}}, \quad (u_n)_n, \quad \text{ou} \quad (u_{1n}, u_{2n}, \dots, u_{mn})_n.$$

Exemplo 15

Em $\mathbb{R}^3$, consideremos a sucessão $(u_n)_n$ definida por $u_n = \left(\frac{1}{n}, 0, n+1\right)$, $n \in \mathbb{N}$.

Os seus termos são $u_1 = (1, 0, 2)$, $u_2 = \left(\frac{1}{2}, 0, 3\right)$, $u_3 = \left(\frac{1}{3}, 0, 4\right)$, ... ■

Dada uma sucessão $(u_n)_n$ em $\mathbb{R}^m$, uma sua *subsucessão* é uma qualquer restrição da aplicação $u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^m$ a um subconjunto infinito de $\mathbb{N}$, digamos a

$$\mathbb{N}^* = \{n_1, n_2, \dots, n_p, \dots\} \quad \text{com} \quad n_1 < n_2 < \dots < n_p < \dots$$

Tal subsucessão representa-se por $(u_{n_p})_{p \in \mathbb{N}}$.

Exemplo 16

Consideremos a sucessão $(u_n)_n$ de $\mathbb{R}^3$ definida no Exemplo 15. Uma subsucessão de $(u_n)_n$ é, por exemplo, a sucessão constituída pelos termos de ordem par, *i.e.* por

$$u_{n_1} = u_2 = \left(\frac{1}{2}, 0, 3\right), \quad u_{n_2} = u_4 = \left(\frac{1}{4}, 0, 5\right), \quad u_{n_3} = u_6 = \left(\frac{1}{6}, 0, 7\right), \dots$$

escrita na forma geral por

$$(u_{n_p})_{p \in \mathbb{N}} = (u_{2p})_{p \in \mathbb{N}} = \left(\frac{1}{2p}, 0, 2p + 1\right)_{p \in \mathbb{N}}.$$

Outro exemplo é a sucessão constituída pelos termos cuja ordem é múltipla de 10,

$$u_{n_1} = u_{10} = \left(\frac{1}{10}, 0, 11\right), \quad u_{n_2} = u_{20} = \left(\frac{1}{20}, 0, 21\right), \quad u_{n_3} = u_{30} = \left(\frac{1}{30}, 0, 31\right), \dots$$

escrita na forma geral por

$$(u_{n_p})_{p \in \mathbb{N}} = (u_{10p})_{p \in \mathbb{N}} = \left(\frac{1}{10p}, 0, 10p + 1\right)_{p \in \mathbb{N}}.$$

Não são subsucessões de $(u_n)_n$:

1. seqüências finitas

$$(1, 0, 2), \left(\frac{1}{2}, 0, 3\right), \left(\frac{1}{3}, 0, 4\right);$$

2. troca de ordem de alguns termos

$$(1, 0, 2), \left(\frac{1}{3}, 0, 4\right), \left(\frac{1}{2}, 0, 3\right), \left(\frac{1}{4}, 0, 5\right), \left(\frac{1}{5}, 0, 6\right), \dots;$$

3. existência de termos que não são termos de $(u_n)_n$

$$(1, 0, 2), (1, 0, 0), \left(\frac{1}{3}, 0, 4\right), \left(\frac{1}{4}, 0, 5\right), \left(\frac{1}{5}, 0, 6\right), \dots$$

■

Dada uma sucessão $(u_n)_n$ em $\mathbb{R}^m$,

$$u_n = (u_{1n}, u_{2n}, \dots, u_{mn})_n,$$

designa-se por *sucessão das primeiras componentes* de $(u_n)_n$ à sucessão em $\mathbb{R}$, $(u_{1n})_n$, isto é

$$u_{11}, u_{12}, u_{13}, \dots, u_{1n}, \dots$$

A sucessão em $\mathbb{R}$, $(u_{2n})_n$, cujos termos são

$$u_{21}, u_{22}, u_{23}, \dots, u_{2n}, \dots,$$

designa-se por *sucessão das segundas componentes*.

Assim, definem-se as m *sucessões componentes* em $\mathbb{R}$

$$(u_{kn})_n, \quad k = 1, 2, \dots, m.$$

da sucessão $(u_n)_n$.

Definir uma sucessão em $\mathbb{R}^m$ equivale assim a definir m sucessões em $\mathbb{R}$. Esta identificação será aproveitada ao longo de todo o capítulo, na medida em que irá permitir uma transposição imediata, para sucessões de $\mathbb{R}^m$, das propriedades já estudadas para as sucessões reais no Cálculo.

2.2 Sucessão limitada

Uma sucessão $(u_n)_n$ diz-se *limitada* quando o conjunto dos seus termos,

$$\mathcal{T} = \{u_n : n \in \mathbb{N}\},$$

é limitado em $\mathbb{R}^m$, ou seja, quando

$$\exists M \in \mathbb{R}^+ : \|u_n\| \leq M, \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad (3)$$

Propriedade 5

Toda a subsucessão de uma sucessão limitada é também limitada.

Demonstração: Sendo $(u_n)_n$ uma sucessão limitada, então o conjunto dos seus termos

$$\mathcal{T} = \{u_n : n \in \mathbb{N}\}$$

é limitado. Dada uma subsucessão $(u_{n_p})_p$ de $(u_n)_n$, tem-se que o conjunto dos seus termos

$$\mathcal{S} = \{u_{n_p} : p \in \mathbb{N}\}$$

está contido em $\mathcal{T}$, logo S é também limitado, donde a subsucessão $(u_{n_p})_p$ é limitada. ■

Um resultado importante, que se revela muito útil quando se trata de averiguar se uma sucessão é limitada, é o seguinte.

Teorema 4

Uma sucessão $(u_n)_n$ é limitada em $\mathbb{R}^m$ se e só se cada uma das suas m sucessões componentes, $(u_{kn})_n$, $k = 1, 2, \dots, m$, é limitada em $\mathbb{R}$.

Demonstração

Vamos fazer a demonstração recorrendo à norma infinito (cf. a definição (10b) do capítulo I).

- Suponha-se que $(u_n)_n$ é limitada em $\mathbb{R}^m$.

Então $\exists M \in \mathbb{R}^+ : \|u_n\|_\infty \leq M, \forall n \in \mathbb{N}$,

ou seja, $\exists M \in \mathbb{R}^+ : \max \{ |u_{1n}|, |u_{2n}|, \dots, |u_{mn}| \} \leq M$.

Consequentemente, $\exists M \in \mathbb{R}^+ : \forall n \in \mathbb{N}, (|u_{1n}| \leq M \wedge \dots \wedge |u_{mn}| \leq M)$, pelo que cada sucessão $(u_{kn})_n$ é limitada em $\mathbb{R}$.

- Reciprocamente, suponha-se que cada sucessão $(u_{kn})_n$ é limitada em $\mathbb{R}$, $k = 1, 2, \dots, m$.

Então

$$\exists M_1 \in \mathbb{R}^+ : |u_{1n}| \leq M_1, \quad \forall n \in \mathbb{N},$$

$$\exists M_2 \in \mathbb{R}^+ : |u_{2n}| \leq M_2, \quad \forall n \in \mathbb{N},$$

$$\dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots$$

$$\exists M_m \in \mathbb{R}^+ : |u_{mn}| \leq M_m, \quad \forall n \in \mathbb{N},$$

e pondo $M = \max \{M_1, M_2, \dots, M_m\}$, resulta

$$(|u_{1n}| \leq M, |u_{2n}| \leq M, \dots, |u_{mn}| \leq M), \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

donde

$$\|u_n\|_\infty \leq M, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

significando que a sucessão $(u_n)_n$ é limitada em $\mathbb{R}^m$. ■

Exemplo 17

Consideremos em $\mathbb{R}^2$ as sucessões $(u_n)_n$ e $(v_n)_n$ definidas por

$$u_n = \left(1, \frac{(-1)^n}{n^2} \right), \quad v_n = \left(n, \frac{(-1)^n}{n^2} \right), \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad (4)$$

Pelo Teorema 4, é imediato que $(u_n)_n$ é limitada e que $(v_n)_n$ não é limitada. ■

2.3 Limite de uma sucessão

Dada uma sucessão $(u_n)_n$ em $\mathbb{R}^m$ e um elemento $L \in \mathbb{R}^m$, dizemos que a sucessão $(u_n)_n$ *converge* para L , ou que L é o *limite* da sucessão $(u_n)_n$, quando existe uma ordem a partir da qual todos os termos da sucessão estão tão próximos de L quanto se queira. Ou seja, a partir de uma ordem suficientemente grande, todos os termos da sucessão estão arbitrariamente próximos de L .

Formalmente, dizemos que $(u_n)_n$ *converge* para L , denotando-se por

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = L \quad \text{ou} \quad u_n \rightarrow L$$

se

$$\forall \delta > 0, \exists p \in \mathbb{N} : n > p \implies \|u_n - L\| < \delta \quad (5)$$

ou equivalentemente

$$\forall \delta > 0, \exists p \in \mathbb{N} : n > p \implies u_n \in B(L, \delta) \quad (6)$$

Da definição (6) sai que, quando $\lim_n u_n = L$, é possível colocar todos os termos da sucessão numa bola aberta centrada em L com raio arbitrariamente pequeno, à excepção, possivelmente, de um número finito de termos (aqueles até à ordem p , *inclusive*).

Se uma sucessão $(u_n)_n$ converge para algum $L \in \mathbb{R}^m$, diz-se que $(u_n)_n$ é *convergente*. Caso contrário, diz-se que $(u_n)_n$ é *divergente*.

Exercício 1

Sejam $(u_n)_n$ uma sucessão de $\mathbb{R}^m$ e $L \in \mathbb{R}^m$.

(a) Use a definição de limite para mostrar que

$$\lim_n u_n = L \implies \lim_n \|u_n\| = \|L\| \quad (7)$$

Sugestão: Comece por mostrar que

$$\|u_n\| \leq \|L\| + \|u_n - L\| \quad \wedge \quad \|L\| \leq \|u_n\| + \|u_n - L\|$$

e conclua que

$$|\|u_n\| - \|L\|| \leq \|u_n - L\|$$

(b) Mostre que o recíproco da implicação (7) é verdadeiro se e só se $L = (0, \dots, 0)$. ■

Teorema 5

Sejam $(u_n)_n$ uma sucessão em $\mathbb{R}^m$ e $L \in \mathbb{R}^m$, com

$$u_n = (u_{1n}, u_{2n}, \dots, u_{mn}), \quad L = (l_1, l_2, \dots, l_m).$$

Então $(u_n)_n$ converge para L se e só se cada uma das suas m sucessões componentes $(u_{kn})_n$ converge para l_k , $k = 1, 2, \dots, m$.

Demonstração

(recorrendo à norma infinito)

- Suponha-se que $(u_n)_n$ converge para L .
Então $\forall \delta > 0, \exists p \in \mathbb{N} : n > p \implies \|u_n - L\|_\infty < \delta$,
ou seja, $\forall \delta > 0, \exists p \in \mathbb{N} : n > p \implies \max \{ |u_{1n} - l_1|, \dots, |u_{mn} - l_m| \} < \delta$,
donde $\forall \delta > 0, \exists p \in \mathbb{N} : n > p \implies (|u_{1n} - l_1| < \delta \wedge \dots \wedge |u_{mn} - l_m| < \delta)$,
pelo que cada sucessão $(u_{kn})_n$ converge para l_k , $k = 1, 2, \dots, m$.
- Reciprocamente, suponha-se que cada sucessão $(u_{kn})_n$ converge para l_k , $k = 1, 2, \dots, m$.
Então, dado $\delta > 0$, arbitrário,

$$\begin{aligned} \exists p_1 \in \mathbb{N} : n > p_1 &\implies |u_{1n} - l_1| < \delta \\ \exists p_2 \in \mathbb{N} : n > p_2 &\implies |u_{2n} - l_2| < \delta \\ \dots &\dots \dots \dots \\ \exists p_m \in \mathbb{N} : n > p_m &\implies |u_{mn} - l_m| < \delta \end{aligned}$$

e pondo $p = \max \{p_1, p_2, \dots, p_m\}$, resulta que

$$n > p \implies (|u_{1n} - l_1| < \delta, |u_{2n} - l_2| < \delta, \dots, |u_{mn} - l_m| < \delta)$$

Consequentemente,

$$\forall \delta > 0, \exists p \in \mathbb{N} : n > p \implies \|u_n - L\|_\infty < \delta$$

significando que a sucessão $(u_n)_n$ converge para L . ■

O Teorema 5 permite estender, de forma imediata, às sucessões em $\mathbb{R}^m$ muitos dos resultados conhecidos para sucessões de números reais. Alguns exemplos são os seguintes.

Propriedade 6

- Se $(u_n)_n$ é convergente em $\mathbb{R}^m$ então o seu limite é único.
- Se $(u_n)_n$ converge para $L \in \mathbb{R}^m$ então qualquer sua subsucessão converge para L .
- Toda a sucessão convergente é limitada.

(d) Dadas as sucessões $(u_n)_n$ e $(v_n)_n$ convergentes para U e V , respectivamente, então

$$(i) \quad \lim_n (u_n + v_n) = U + V \quad (8a)$$

$$(ii) \quad \lim_n (\alpha u_n) = \alpha U, \quad \forall \alpha \in \mathbb{R} \quad (8b)$$

$$(iii) \quad \lim_n \langle u_n, v_n \rangle = \langle U, V \rangle \quad \text{produto interno euclidiano} \quad (8c)$$

$$(iv) \quad \lim_n \|u_n\| = \|U\| \quad \text{norma qualquer} \quad (8d)$$

Demonstração:

(a) Seja $(u_n)_n$ uma sucessão convergente em $\mathbb{R}^m$.

Suponhamos que existem $A, B \in \mathbb{R}^m$, $A = (a_1, a_2, \dots, a_m)$, $B = (b_1, b_2, \dots, b_m)$, tais que $\lim_n u_n = A$ e $\lim_n u_n = B$. Pelo Teorema 5, conclui-se que, por um lado, cada $(u_{kn})_n$ converge para a_k e, por outro lado, cada $(u_{kn})_n$ converge para b_k . Da unicidade do limite de sucessões reais, sai que $a_k = b_k$, $k = 1, 2, \dots, m$, donde se conclui que $A = B$.

(b) Seja $(u_n)_n$ uma sucessão convergente para A , com

$$u_n = (u_{1n}, u_{2n}, \dots, u_{mn}), \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad A = (a_1, a_2, \dots, a_m)$$

Pelo Teorema 5, cada $(u_{kn})_n$ converge para a_k .

Seja agora $(u_{np})_p$ uma subsucessão de $(u_n)_n$, com

$$u_{np} = (u_{1np}, u_{2np}, \dots, u_{mnp}), \quad \forall p \in \mathbb{N}.$$

Para cada $k = 1, 2, \dots, m$, a sucessão real $(u_{knp})_p$ é uma subsucessão da sucessão real $(u_{kn})_n$ e, portanto, também $(u_{knp})_p$ converge para a_k . Logo, $(u_{np})_p$ converge para A .

(c) Seja $(u_n)_n$ uma sucessão convergente. Pelo Teorema 5, cada uma das suas sucessões componentes é também convergente (em $\mathbb{R}$), logo limitada. Pelo Teorema 4, a sucessão dada é também limitada.

(d) Para a parte (i), basta atender a que as sucessões componentes de $(u_n + v_n)_n$ são $(u_{kn} + v_{kn})_n$, cada uma convergente para $a_k + b_k$, $k = 1, 2, \dots, m$ e mais uma vez usar o Teorema 5.

Para a parte (ii), analogamente basta atender a que as sucessões componentes de $(\alpha u_n)_n$ são $(\alpha u_{kn})_n$, cada uma convergente para αa_k , $k = 1, 2, \dots, m$ e usar o Teorema 5.

Para a parte (iii), atenda-se a que

$$\langle u_n, v_n \rangle = u_{1n}v_{1n} + u_{2n}v_{2n} + \dots + u_{mn}v_{mn}$$

e a que cada sucessão real $(u_{kn}v_{kn})_n$ converge para $a_k b_k$.

Logo, a sucessão real $(u_{1n}v_{1n} + u_{2n}v_{2n} + \dots + u_{mn}v_{mn})_n$ converge para $a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_m b_m$, ou seja, para $\langle A, B \rangle$.

Para a parte (iv), atender ao Exercício 1. No caso particular da norma euclidiana, bastaria usar o resultado de (iii) e atender a que $\|\cdot\| = \sqrt{\langle \cdot, \cdot \rangle}$.

Teorema 6 [Bolzano-Weierstrass ($\mathbb{R}^m$)]

Qualquer sucessão limitada em $\mathbb{R}^m$ possui uma subsucessão convergente.

Demonstração:

Seja $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ uma sucessão limitada em $\mathbb{R}^m$. Pelo Teorema 4, as suas sucessões componentes, $(u_{kn})_{n \in \mathbb{N}}$, $k = 1, 2, \dots, m$, são também limitadas (em $\mathbb{R}$). Pelo teorema de Bolzano-Weierstrass para sucessões reais, concluímos que, em particular a sucessão componente $(u_{1n})_{n \in \mathbb{N}}$ possui uma subsucessão convergente, digamos $(u_{1n_p})_{p \in \mathbb{N}}$, para um número real l_1 .

A subsucessão $(u_{n_p})_{p \in \mathbb{N}}$ de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ é limitada, logo a sua 2ª sucessão componente $(u_{2n_p})_{p \in \mathbb{N}}$ é também limitada e mais uma vez pelo teorema de Bolzano-Weierstrass para sucessões reais conclui-se a existência de $(u_{2n_{p_s}})_{s \in \mathbb{N}}$ subsucessão de $(u_{2n_p})_{p \in \mathbb{N}}$ convergente para um número real l_2 .

Assim a subsucessão $(u_{n_{p_s}})_{s \in \mathbb{N}}$ é uma subsucessão de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ com a 1ª e a 2ª sucessão componente convergentes para l_1 e l_2 respectivamente.

Procedendo de forma análoga, durante mais $m-2$ etapas, constrói-se uma subsucessão de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ convergente para um $L = (l_1, l_2, \dots, l_m)$. ■

2.4 Sucessão de Cauchy

A terminar este capítulo, vamos agora identificar o conceito de sucessão de Cauchy, no contexto das sucessões em $\mathbb{R}^m$.

À semelhança do que se passa em $\mathbb{R}$, dizemos que uma sucessão $(u_n)_n$ de elementos de $\mathbb{R}^m$ é uma *sucessão de Cauchy* quando a partir de uma ordem suficientemente grande, todos os termos da sucessão estão arbitrariamente próximos uns dos outros. Formalmente, dizemos que uma sucessão $(u_n)_n$ em $\mathbb{R}^n$ é de *Cauchy* quando

$$\forall \delta > 0, \exists p \in \mathbb{N}: k > p, \ell > p \implies \|u_k - u_\ell\| < \delta \quad (9)$$

Em termos de sucessões componentes, podemos estabelecer o seguinte resultado.

Teorema 7

Seja $(u_n)_n$ uma sucessão em $\mathbb{R}^m$ com $u_n = (u_{1n}, u_{2n}, \dots, u_{mn})$. Então $(u_n)_n$ é sucessão de Cauchy se e só se cada sucessão componente $(u_{kn})_n$ é sucessão de Cauchy.

Demonstração: Exercício (usar a norma infinito). ■

Como consequência do Teorema 5, do Teorema 7, e da equivalência, em $\mathbb{R}$, das noções de sucessão de Cauchy e de sucessão convergente, obtém-se o seguinte resultado.

Teorema 8

Em $\mathbb{R}^m$, uma sucessão $(u_n)_n$ é de Cauchy se e só se é convergente.

Demonstração:

Articulando de forma conveniente os resultados referidos, vem sucessivamente

$(u_n)_n$ é uma sucessão de Cauchy em $\mathbb{R}^m$

$\iff (u_{kn})_n$ é uma sucessão de Cauchy em $\mathbb{R}$, $k = 1, 2, \dots, m$ (Teorema 7)

$\iff (u_{kn})_n$ é uma sucessão convergente em $\mathbb{R}$, $k = 1, 2, \dots, m$

$\iff (u_n)_n$ é uma sucessão convergente em $\mathbb{R}^m$. (Teorema 5)

■

Exercício 2

1. Considere a seguinte sucessão em $\mathbb{R}^4$:

$$(v_n)_n = \left(1 - \frac{1}{n}, (-1)^n, \frac{2n+3}{3n}, \cos(n\pi) \right)_n.$$

- (a) Identifique as sucessões componentes da sucessão $(v_n)_n$;
- (b) Determine o termo de ordem 7 da sucessão $(v_n)_n$;
- (c) Determine a subsucessão dos termos pares de $(v_n)_n$;
- (d) Determine a subsucessão dos termos ímpares de $(v_n)_n$;
- (e) Apresente uma sucessão $(w_n)_n$ em $\mathbb{R}^4$ que não seja subsucessão de $(v_n)_n$, mas que

$$\{w_n : n \in \mathbb{N}\} \subseteq \{v_n : n \in \mathbb{N}\}.$$

- (f) Mostre que a sucessão $(v_n)_n$ é limitada.

2. Considere o seguinte subconjunto de $\mathbb{R}^3$:

$$A = \{(3, 2, 1), (1, 0, 0), (0, 0, 0)\}.$$

- (a) Apresente, caso exista, uma sucessão em $\mathbb{R}^3$ cujo conjunto dos seus termos seja A ;
 - (b) Apresente, caso exista, uma sucessão em $\mathbb{R}^3$ não limitada cujo conjunto dos seus termos contenha A ;
 - (c) Apresente, caso exista, uma sucessão em $\mathbb{R}^3$ cujo conjunto dos seus termos contenha A e a sucessão das 3^a componentes seja constante;
 - (d) Apresente, caso exista, uma sucessão em $\mathbb{R}^3$ não limitada que possua uma subsucessão com o conjunto dos termos estritamente contido em A .
3. Mostre que um sucessão $(u_n)_n$ em $\mathbb{R}^m$ é limitada se e só se cada uma das suas m sucessões componentes é limitada em $\mathbb{R}$.

Sugestão: Use a norma do máximo.

4. Considere a seguinte sucessão em $\mathbb{R}^3$:

$$(u_n)_n = \left(\frac{1}{n}, (-1)^n, n \operatorname{sen} \left(n \frac{\pi}{2} \right) \right)_n.$$

- (a) Identifique a sucessão das 3^a componentes da sucessão $(u_n)_n$;
- (b) Apresente, caso exista, uma subsucessão de $(u_n)_n$ limitada;
- (c) Apresente, caso exista, uma subsucessão de $(u_n)_n$ não limitada;
- (d) A sucessão $(u_n)_n$ é limitada? Justifique.

5. Usando a definição de limite de uma sucessão, mostre que

$$\lim_n \left(\frac{2}{n+5}, \frac{4n+2}{n+5} \right) = (0, 4)$$

6. Calcule, caso existam, $\lim_n a_n$ e $\lim_n b_n$ para:

$$(a) \quad a_n = \left(\frac{\sqrt{n}}{n^2}, -2 + \frac{4n}{1+n^3}, 3 \right), \quad b_n = \left(\frac{2n^2 - n - 1}{5n^2 + n - 3}, \sqrt[3]{n^3 + 1}, 0 \right)$$

$$(b) \quad a_n = (\cos(n\pi), 0, \operatorname{sen}(n\pi)), \quad b_n = \left((-1)^n \frac{n+1}{e^n}, \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{\frac{n}{2}} \right)$$

$$(c) \quad a_n = \left(\frac{n}{\log^2(n+3)}, 0 \right), \quad b_n = \left(\frac{\operatorname{sen} n}{n}, n \operatorname{sen} \frac{1}{n}, \operatorname{sen} \frac{\pi}{n} \right)$$

$$(d) \quad a_n = (\pi, 0, e), \quad b_n = \begin{cases} \left(\frac{n+1}{2n}, 0 \right) & \text{se } n \text{ é par} \\ \left(\frac{1}{2}, e^{-n} \right) & \text{se } n \text{ é ímpar} \end{cases}$$

$$(e) \quad a_n = \begin{cases} \left(\frac{1+n}{2n}, \frac{1}{\sqrt{n}} \right) & \text{se } n \text{ é par} \\ \left(\frac{1-n}{2n}, e^{-n} \right) & \text{se } n \text{ é ímpar} \end{cases}$$

$$(f) \quad a_n = \begin{cases} \left(n^2 + 2, \frac{1}{n} \right) & \text{se } n < 12 \\ \left(\frac{n+3}{-2n}, e^{-n} \right) & \text{se } n \geq 12 \end{cases}$$

$$(g) \quad a_n = \begin{cases} \left(\frac{\cos n}{n+1}, 0 \right) & \text{se } n = 3k - 2 \\ (0, 0) & \text{se } n = 3k - 1, \\ \left(e^{-n^2}, \log(n) - \log(n+1) \right) & \text{se } n = 3k \end{cases} \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

7. Diga, justificando, se cada uma das seguintes afirmações é *verdadeira* ou *falsa*:

- (a) toda a subsucessão de uma sucessão convergente é convergente;
- (b) toda a subsucessão de uma sucessão divergente é divergente;
- (c) se $(u_n)_n$ e $(v_n)_n$ são sucessões divergentes então $(u_n + v_n)_n$ é divergente;
- (d) se $(u_n)_n$ e $(v_n)_n$ são sucessões divergentes então $(\langle u_n, v_n \rangle)_n$ é divergente;
- (e) $\lim_n u_n = 0$ se e só se $\lim_n \|u_n\| = 0$;
- (f) $\lim_n u_n = a$, com $a \neq 0$, se e só se $\lim_n \|u_n\| = \|a\|$;
- (g) se $(u_n)_n$ e $(w_n)_n$ são sucessões tais que $\lim_n u_n = \lim_n w_n = 0$ e $(v_n)_n$ é outra sucessão de $\mathbb{R}^m$ para a qual, a partir de uma certa ordem p , se tem $\|u_n\| \leq \|v_n\| \leq \|w_n\|$, $\forall n > p$, então $\lim_n v_n = 0$;
- (h) se $(u_n)_n$ e $(w_n)_n$ são sucessões tais que $\lim_n u_n = \lim_n w_n = a$, com $a \neq 0$, e $(v_n)_n$ é uma sucessão para a qual, a partir de uma certa ordem p , se tem $\|u_n\| \leq \|v_n\| \leq \|w_n\|$, $\forall n > p$, então $\lim_n v_n = a$;
- (i) se $(u_n)_n$ é uma sucessão limitada então $(u_n)_n$ é uma sucessão de Cauchy;
- (j) se $(u_n)_n$ e $(v_n)_n$ são sucessões tais que $(u_n)_n$ e $(u_n - 2v_n)_n$ são convergentes então $(v_n)_n$ é convergente;
- (k) se $(u_n)_n$ e $(v_n)_n$ são sucessões reais convergentes então $(1 + u_n, \frac{u_n}{n}, u_n - 2v_n)_n$ é uma sucessão de Cauchy;
- (l) se $(u_n)_n$ é uma sucessão tal que $\{u_n : n \in \mathbb{N}\}$ é finito então $(u_n)_n$ é convergente;
- (m) se $(u_n)_n$ é uma sucessão tal que $\{u_n : n \in \mathbb{N}\} = \{(1, 1, 1), (1, 2, 3)\}$ então $(u_n)_n$ é divergente.

8. Quando possível, apresente uma sucessão de $\mathbb{R}^3$ que seja:

- (a) de Cauchy mas não convergente;
- (b) de Cauchy mas não limitada;
- (c) limitada mas não de Cauchy;
- (d) não limitada e que possua uma subsucessão convergente;
- (e) convergente para $(0, 1, e)$;
- (f) divergente e possua uma subsucessão de Cauchy;
- (g) convergente para $(0, 0, 0)$ e com todos os termos na bola $B((0, 0, 0), 1)$;
- (h) divergente e com todos os termos na bola $((0, 0, 0), 1)$;

- (i) convergente para $(0, 0, 0)$ e com todos os termos em $\mathbb{R}^3 \setminus B((0, 0, 0), 1)$;
- (j) de Cauchy e que possua uma subsucessão divergente;
- (k) divergente e que possua uma subsucessão convergente para $(e, \pi, \sqrt{2})$;
- (l) convergente e que possua uma subsucessão não limitada;
- (m) convergente para $(0, 0, 0)$ e que possua uma subsucessão convergente para $(0, 1, 0)$;
- (n) de Cauchy, com termos em $B((0, 0, 0), 1)$ e em $B((5, 5, 5), 1)$.