

Nome N° ENGFIS
 FIS

Instruções: responda e justifique brevemente as suas respostas nesta folha;
se necessário, utilize uma folha de exame para apresentar mais cálculos.

1. (2 valores) Resolva a equação

$$z^3 = 1 + i.$$

$$z = \sqrt[6]{2} e^{i\pi/12}, \quad z = \sqrt[6]{2} e^{i\pi 9/12} \quad \text{ou} \quad z = \sqrt[6]{2} e^{i\pi 17/12}$$

2. (2 valores) Verifique se a seguinte função, definida em $\mathbb{C}^\times = \mathbb{C} \setminus \{0\}$, é holomorfa:

$$f(x+iy) = \frac{1}{x-iy}.$$

A função $f(z) = 1/\bar{z}$ não é holomorfa, pois $\bar{\partial}f = -1/\bar{z}^2 \neq 0$.

3. (2 valores) Determine o disco de convergência da seguinte série de potências, e, se possível, uma expressão compacta para a função holomorfa que define:

$$\sum_{n=0}^{\infty} n(z-1)^n$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} n(z-1)^n = \frac{z-1}{(2-z)^2} \quad \text{no disco } |z-1| < 1.$$

4. (2 valores) Calcule o seguinte integral, onde $\gamma = \{z(t) = e^{it} : t \in [\pi/2, 3\pi/2]\}$,

$$\int_{\gamma} \frac{dz}{z^2}.$$

$$\int_{\gamma} \frac{dz}{z^2} dz = -2i.$$

5. (2 valores) Calcule o integral

$$\oint_{|z|=1} \frac{\sin(z)}{z} dz.$$

$$\oint_{|z|=1} \frac{\sin(z)}{z} dz = 0.$$

6. (2 valores) Calcule o integral

$$\oint_{|z|=1} \frac{\sin(z)}{z^2} dz.$$

$$\oint_{|z|=1} \frac{\sin(z)}{z^2} dz = 2\pi i.$$

7. (2 valores) Determine a série de Taylor em torno de $p = 0$, e o seu disco de convergência, da função

$$f(z) = z e^{-z^2}$$

$$z e^{-z^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} z^{2n+1} = z - z^3 + \frac{z^5}{2} - \frac{z^7}{6} + \dots \quad \text{se } |z| < \infty.$$

8. (2 valores) Resolva

$$\sin(z) = 2i.$$

$$z = -i \log(\sqrt{5} - 2) + 2\pi\mathbb{Z} \quad \text{ou} \quad z = -i \log(\sqrt{5} + 2) - \pi + 2\pi\mathbb{Z}.$$

9. (2 valores) Determine as possíveis expansões em série de Laurent centradas em 0 da função

$$f(z) = \frac{1}{z^2 + 1}.$$

$$f(z) = 1 - z^2 + z^4 - z^6 + \dots \quad \text{se } |z| < 1.$$

e

$$f(z) = \frac{1}{z^2} - \frac{1}{z^4} + \frac{1}{z^6} - \frac{1}{z^8} + \dots \quad \text{se } |z| > 1.$$

10. (2 valores) Determine e classifique as singularidades isoladas da função

$$f(z) = \frac{\sin(z)}{z^4 + z^2}.$$

As singularidades isoladas são três pólos simples em 0 e $\pm i$.

Nome N° ENGFIS
 FIS

Instruções: responda e justifique brevemente as suas respostas nesta folha;
se necessário, utilize uma folha de exame para apresentar mais cálculos.

1. (2 valores) Calcule o integral

$$\oint_{|z|=2} z^3 e^{1/z^2} dz.$$

$$\oint_{|z|=2} z^3 e^{1/z^2} dz = i\pi.$$

2. (2 valores) Calcule o integral

$$\int_0^\infty \frac{\cos(x)}{x^2 + 9} dx.$$

$$\int_0^\infty \frac{\cos(x)}{x^2 + 9} dx = \frac{\pi}{6} e^{-3}.$$

3. (2 valores) Calcule o integral

$$\int_0^\pi \frac{\cos(2\theta)}{3 - \cos(\theta)} d\theta.$$

$$\int_0^\pi \frac{\cos(2\theta)}{2 + \sin(\theta)} d\theta = \pi \left(\frac{\left(3 - 2\sqrt{2}\right)^4 + 1}{4\sqrt{2} \left(3 - 2\sqrt{2}\right)^2} - 6 \right) = \pi \left(\frac{17}{4} \sqrt{2} - 6 \right) \simeq 0.0327.$$

4. (2 valores) Determine as soluções separáveis da equação da corda vibrante

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0$$

no intervalo $x \in [0, \pi]$, com condições de fronteira $u(0, t) = u(\pi, t) = 0$.

$$(a_n \cos(nt) + b_n \sin(nt)) \sin(nx) \quad \text{com } n = 1, 2, 3, \dots \quad \text{e } a_n, b_n \in \mathbb{R}.$$

5. (2 valores) Calcule a série de Fourier de senos da função definida, no intervalo $[0, \pi]$, por

$$\varphi(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } 0 \leq x \leq \pi/2 \\ 0 & \text{se } \pi/2 < x \leq \pi \end{cases}.$$

$$\frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 - \cos(n\pi/2)}{n} \sin(nx).$$

6. (2 valores) Determine a solução formal do problema da corda vibrante

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0$$

no intervalo $x \in [0, \pi]$, com condições de fronteira $u(0, t) = u(\pi, t) = 0$, e condições iniciais $u(x, 0) = \sin(3x)$ e $\frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = \varphi(x)$ (definida no exercício 5).

$$u(x, t) = \cos(3t) \sin(3x) + \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 - \cos(n\pi/2)}{n^2} \sin(nt) \sin(nx).$$

7. (2 valores) Calcule a transformada de Fourier $\widehat{f}(\xi) = \int e^{-2\pi i \xi t} f(t) dt$ da função definida por $f(t) = 0$ se $t < 0$ e $f(t) = e^{-at}$ se $t \geq 0$, com $a > 0$.

$$\widehat{f}(\xi) = \frac{1}{2\pi i \xi + a}.$$

8. (2 valores) Calcule a transformada de Fourier inversa $h_b(x) = \int_{\mathbb{R}} e^{2\pi i \xi x} \widehat{h}_b(\xi) d\xi$ da gaussiana

$$\widehat{h}_b(\xi) = e^{-4\pi^2 b \xi^2} \quad \text{com } b > 0.$$

$$h_b(x) = \frac{1}{\sqrt{4\pi b}} e^{-x^2/bt}.$$

9. (2 valores) Use a transformada de Fourier para determinar a solução formal da equação

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + u$$

na reta real $x \in \mathbb{R}$, com condição inicial $u(x, 0) = \psi_\varepsilon(x) = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon}} e^{-\pi x^2/\varepsilon}$, com $\varepsilon > 0$.

$$u(x, t) = e^t (\psi_\varepsilon * h_t)(x) = e^t \int_{-\infty}^{\infty} \psi_\varepsilon(y) h_t(x-y) dy.$$

10. (2 valores) Determine o limite quando $\varepsilon \rightarrow 0^+$ da solução do exercício 9.

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} u(x, t) = e^t h_t(x).$$