Análise Matemática - Folhas práticas

BQ e Q 2007/08

Salvatore Cosentino

Departamento de Matemática, Universidade do Minho,

Campus de Gualtar, 4710-057 Braga, PORTUGAL

gab B.4023, tel 253 604086

e-mail scosentino@math.uminho.pt

url w3.math.uminho.pt

8 de Fevereiro de 2008

Conteúdo

1	Problemas e modelos elementares	2
2	Modelos discretos e iteração	4
3	Cálculo diferencial e aplicações	8
4	Área, integral e métodos de integração	11
5	Equações diferenciais ordinárias	16
6	Modelos contínuos	18
7	Curvas e campos escalares	22
8	Derivadas de campos escalares	24
9	Integrais duplos	26
10	Aproximação e análise qualitativa de modelos discretos	28
11	Simulações e sistemas de EDOs	30

1 Problemas e modelos elementares

1. (progressão e série geométrica) Uma *progressão geométrica* de “razão” λ é uma sequência

$$a \quad a\lambda \quad a\lambda^2 \quad a\lambda^3 \quad \dots \quad a\lambda^n \quad a\lambda^{n+1} \quad \dots$$

obtida do termo inicial $x_0 = a$ usando a recursão $x_{n+1} = \lambda x_n$. A identidade

$$(1 + \lambda + \lambda^2 + \lambda^3 + \dots + \lambda^n)(\lambda - 1) = \lambda^{n+1} - 1$$

mostra que, se $\lambda \neq 1$, a soma dos primeiros $n + 1$ termos da progressão geométrica (com $a = 1$) é

$$1 + \lambda + \lambda^2 + \lambda^3 + \dots + \lambda^n = \frac{\lambda^{n+1} - 1}{\lambda - 1}$$

Em particular, quando $|\lambda| < 1$, a *série geométrica* $\sum_{n=0}^{\infty} \lambda^n$ é convergente, e a sua soma é

$$\sum_{n=0}^{\infty} \lambda^n = 1 + \lambda + \lambda^2 + \lambda^3 + \dots + \lambda^n + \dots = \frac{1}{1 - \lambda}$$

- Diga se a seguintes séries são convergentes, e, se for o caso, calcule a soma.

$$1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 + \dots \quad 1 + 10 + 100 + 1000 + \dots \quad 1 + 1/10 + 1/100 + 1/1000 + \dots$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (4/5)^n \quad 9/10 + 9/100 + 9/1000 + \dots \quad 0.3333\dots$$

2. (duplicação de células) As experiências mostram que a população de uma colónia de bactérias, num período de tempo em que podemos considerar ilimitado o nutrimento e desprezáveis as toxinas produzidas, duplica-se em cada hora.

- Se a população inicial é de 1000 células, determine a população passadas 2, 3, 10 horas.
- Quantas horas devo esperar para ver 1024 bactérias a partir de uma única célula inicial?
- Escreva uma fórmula para P_n , a população no tempo n horas, dada uma população inicial P_0 .

3. (invenção do xadrez). Dizem que Sissa inventou o jogo do xadrez e o ofereceu ao rei de Pérsia. Ao rei, que o convidou a escolher uma recompensa, pediu um grão de arroz para o primeiro quadrado do tabuleiro, o dobro, ou seja, dois grãos, para o segundo quadrado, o dobro, ou seja, quatro grãos, pelo terceiro quadrado, e assim a seguir até o último dos quadrados do tabuleiro.

- Quanto grãos de arroz o rei teve que pagar?
- Se 1 Kg de arroz contém à volta de 30000 grãos, quantas toneladas de arroz foram necessárias ao rei para pagar o seu jogo?

4. (tempo de meia-vida) O decaimento de uma substância radioactiva pode ser caracterizado pelo “tempo de meia-vida” τ , passado o qual aproximadamente metade dos núcleos inicialmente presentes terá decaído. Portanto, se Q_n denota a quantidade de substância radioactiva presente no instante $n\tau$, , com n inteiro, então

$$Q_{n+1} = \frac{1}{2} Q_n.$$

- Determine Q_n em função da quantidade inicial Q_0 .
- Determine P_n , a quantidade de producto do decaimento no instante $n\tau$.
- Passado quanto tempo a substância radioactiva fica reduzida a $\frac{1}{32}$ -ésimo da quantidade inicial?
- O tempo de meia-vida do radiocarbono ^{14}C é $\tau \simeq 5730$ anos ($^{14}C \rightarrow ^{14}N + e^- + \bar{\nu}_e$). Mostre como “datar” um fóssil, sabendo que a proporção de ^{14}C num ser vivente é fixa e conhecida.¹

5. (Inflação e juros) A taxa de inflação e os juros costumam ser definidos em base anual. Por exemplo, se a inflação é de $\alpha\%$, então o preço p_n de um artigo no n -ésimo ano segue a lei

$$p_{n+1} = p_n \left(1 + \frac{\alpha}{100} \right).$$

¹J.R. Arnold and W.F. Libby, Age determinations by Radiocarbon Content: Checks with Samples of Known Ages, *Sciences* **110** (1949), 1127-1151.

- Um café custa hoje 50 cêntimos de euro. Se a taxa de inflação se mantiver constante e igual a 2%, quanto custará um café no ano 2017?
 - O meu banco paga juros de 0.20% nos depósitos dos seus clientes. Se eu depositar 10000 euros neste banco, quanto recebo passado um ano, dois anos, ..., n anos?
 - O mesmo banco cobra juros de 9.75% nos empréstimos. Se eu pedir 10000 euros emprestados, e quiser pagar 100 euros cada mês, quantos anos demoro?
6. (**crescimento exponencial**) O crescimento exponencial de uma população num meio ambiente ilimitado é modelado com a equação recursiva

$$P_{n+1} = \lambda P_n$$

onde P_n representa a população no tempo n , dada uma certa população inicial P_0 .

- Interprete o parâmetro λ imaginando que em cada unidade de tempo o incremento $P_{n+1} - P_n$ da população é a soma de uma parcela αP_n , onde $\alpha > 0$ é um coeficiente de fertilidade, e uma parcela $-\beta P_n$, onde $\beta > 0$ é um coeficiente de mortalidade.
 - Discuta o comportamento das soluções da equação recursiva ao variar o parâmetro λ .
7. (**sequência de Fibonacci**) Considere o seguinte problema, posto por Leonardo Pisano (mais conhecido como Fibonacci, ou seja, “filius Bonacci”)²:

Quantos pares de coelhos serão produzidos num ano, começando com um só par, se em cada mês cada par gera um novo par que se torna produtivo a partir do segundo mês?

A resposta de Leonardo Pisano consiste no seguinte modelo. Se F_n o número de pares de coelhos no n -ésimo mês, então

$$F_{n+1} = F_n + F_{n-1}.$$

Esta é uma “lei” que prescreve recursivamente os valores dos F_n dados uns valores iniciais F_0 e F_1 .

- Responda ao problema de Fibonacci, ou seja, determine F_{12} , sabendo que $F_0 = 1$ e $F_1 = 2$.
- Escreva um programa para calcular recursivamente os “números de Fibonacci” F_n .
- Seja $Q_n = F_{n+1}/F_n$ o quociente entre sucessivos números de Fibonacci. Mostre que os quocientes satisfazem a equação recursiva

$$Q_{n+1} = 1 + \frac{1}{Q_n}$$

- Assuma que, para grande valores de n , os quocientes são praticamente constantes, ou seja, $Q_n \rightarrow \Phi$ se $n \rightarrow \infty$. Utilize a a equação recursiva para mostrar que

$$\Phi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \simeq 1.61803398874989\dots$$

- Mostre que o resultado anterior implica a lei assintótica $F_{n+1} \simeq \Phi F_n$. Reconhece-a?

8. (**crescimento com recolha ou adição**) A uma população que cresce segundo o modelo exponencial, é adicionada ou retirada uma certa quantidade β em cada unidade de tempo. O modelo é portanto

$$P_{n+1} = \lambda P_n + \beta$$

onde β é um parâmetro positivo ou negativo.

- Determine soluções estacionárias, ou seja, que não dependem do tempo n .
- Determine a solução com condição inicial P_0 arbitrária.
- Para quais valores dos parâmetros λ e β as soluções P_n convergem para a solução estacionária quando o tempo $n \rightarrow \infty$?

²Leonardo Pisano, *Liber Abaci*, 1202.

2 Modelos discretos e iteração

1. (modelos discretos e análise gráfica) Um sistema dinâmico com tempo discreto é definido por uma equação/lei recursiva

$$x_{n+1} = f(x_n),$$

onde x_n denota o *estado* (posição, população, concentração, temperatura, ...) do sistema no tempo n (segundos, horas, meses, anos, ...). As *trajectórias* do sistema dinâmico são as sucessões (x_n) ,

$$x_0 \mapsto x_1 = f(x_0) \mapsto x_2 = f(x_1) \mapsto \dots \mapsto x_{n+1} = f(x_n) \mapsto \dots,$$

definidas a partir de uma *condição inicial* x_0 usando a recursão $x_{n+1} = f(x_n)$.

As *soluções estacionárias*, ou *de equilíbrio*, são as trajectórias constantes $x_n = \bar{x}$, onde o *estado estacionário*, ou *de equilíbrio*, $\bar{x}$ é um “ponto fixo” da transformação f , ou seja, um ponto tal que

$$f(\bar{x}) = \bar{x}.$$

As *soluções periódicas* são as trajectórias (x_n) tais que $x_{n+p} = x_n$ para todos os n e algum tempo $p \geq 1$, dito *período*.

Se o espaço dos estados é um intervalo da recta real, as trajectórias podem ser observadas no plano x - y esboçando o caminho poligonal (*cobweb plot*)

$$(x_0, x_0) \mapsto (x_0, x_1) \mapsto (x_1, x_1) \mapsto (x_1, x_2) \mapsto (x_2, x_2) \mapsto (x_2, x_3) \mapsto \dots$$

entre o gráfico da transformação, $y = f(x)$, e a diagonal, $y = x$.

- Estude as trajectórias (ou seja, determine os estados de equilíbrio, as trajectórias periódicas, e o comportamento assintótico de algumas das outras trajectórias) dos sistemas dinâmicos definidos pelas seguintes transformações

$$f(x) = \frac{1}{3}x \quad f(x) = 7x \quad f(x) = -x$$

$$f(x) = 3x + 1 \quad f(x) = 2x - 7 \quad f(x) = \frac{1}{2}x + 5$$

$$f(x) = |1 - x| \quad f(x) = x^2 - \frac{1}{4} \quad f(x) = x^2 - 2$$

$$f(x) = x^3 \quad f(x) = -x^3 \quad f(x) = x^{1/3}$$

$$f(x) = x - x^3 \quad f(x) = x + x^3$$

- Mostre que, se uma trajectória (x_n) do sistema dinâmico $x_{n+1} = f(x_n)$ é convergente e se a transformação f é contínua, então o limite $x_\infty = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ é um estado estacionário, ou seja, $f(x_\infty) = x_\infty$.

2. (transformação logística) Um modelo mais realista da dinâmica de uma população num meio ambiente limitado é

$$P_{n+1} = \lambda P_n (1 - P_n/M)$$

onde a contante $M > 0$ é a maior população suportada pelo meio ambiente (observe que $P_{n+1} < 0$ quando $P_n > M$, o que pode ser interpretado como “extinção” no tempo $n + 1$). A substituição $x_n = P_n/M$ transforma a lei acima na forma adimensional

$$x_{n+1} = \lambda x_n (1 - x_n),$$

chamada *transformação logística*³.

- Esboce o gráfico da transformação logística para diferentes valores do parâmetro λ .

Gráficos da transformação logística quando $\lambda = 0.5$, $\lambda = 2$, $\lambda = 3$ e $\lambda = 4$.

- Mostre que os ponto estacionários são o estado trivial 0 e

$$\bar{x} = \frac{\lambda - 1}{\lambda}$$

- Implemente um programa para fazer simulações do sistema.
 - Discuta e interprete o comportamento das soluções para valores do parâmetro $0 < \lambda \leq 1$.
 - Discuta e interprete o comportamento das soluções para valores do parâmetro $1 < \lambda \leq 3$.
 - Observe os fenômenos que acontecem ao variar o parâmetro λ entre 3 e 4.
 - O que acontece quando $\lambda > 4$?
3. (equilíbrio de Hardy-Weinberg) Considere a transmissão hereditária de um gene com dois alelos, A e a . Sejam x_0 , y_0 e z_0 as frequências dos genótipos AA , Aa e aa , respectivamente, numa dada população inicial. Então as probabilidade de ter o alelo A ou a na formação de um gameta são

$$p_0 = x_0 + \frac{1}{2}y_0 \quad \text{e} \quad q_0 = 1 - p_0 = z_0 + \frac{1}{2}y_0,$$

respectivamente. Na fecundação, teremos os genótipos AA , Aa e aa com probabilidades p_0^2 , $2p_0q_0$ e q_0^2 , respectivamente. Portanto, na primeira geração, as frequências dos três genótipos serão

$$x_1 = p_0^2, \quad y_1 = 2p_0q_0 \quad \text{e} \quad z_1 = q_0^2.$$

- Calcule as probabilidades

$$p_1 = x_1 + \frac{1}{2}y_1 \quad \text{e} \quad q_1 = z_1 + \frac{1}{2}y_1$$

de ter os alelos A ou a na formação de um gameta na primeira geração, e mostre que as frequências dos três genótipos na segunda geração serão

$$x_2 = p_0^2, \quad y_2 = 2p_0q_0 \quad \text{e} \quad z_2 = q_0^2.$$

Ou seja, a distribuição dos três genótipos atinge um valor estacionário a partir da primeira geração (*Hardy-Weinberg equilibrium/principle/law*⁴)

³Robert M. May, Simple mathematical models with very complicated dynamics, *Nature* **261** (1976), 459-467.

⁴G.H. Hardy, Mendelian proportions in a mixed population, *Science* **28** (1908), 49-50. W. Weinberg, Über den Nachweis der Vererbung beim Menschen, *Jahreshefte des Vereins für vaterländische Naturkunde in Württemberg* **64** (1908), 368-382.

4. (selecção natural, modelo de Fisher, Wright e Haldane) Um modelo simples de selecção natural, proposto por Ronald Fisher, Sewall Wright e J.B.S. Haldane em 1930⁵, considera apenas um gene com dois alelos, A e a . A vantagem ou desvantagem competitiva dos diferentes genótipos, AA , Aa e aa , é modelada por coeficientes de “sucesso biológico” (*fitness*), ϕ_{AA} , ϕ_{Aa} e ϕ_{aa} , que determinam as diferentes taxas de sobrevivência, e portanto de reprodução. Sejam $0 \leq p_n \leq 1$ e $q_n = 1 - p_n$ as frequências dos alelos A e a , respectivamente, na n -ésima geração. Então a frequência do alelo A na $(n + 1)$ -ésima geração é dada por

$$p_{n+1} = \frac{(1 + \alpha)p_n^2 + p_n q_n}{(1 + \alpha)p_n^2 + 2p_n q_n + (1 + \beta)q_n^2}$$

onde $(1 + \alpha) = \phi_{AA}/\phi_{Aa}$ e $(1 + \beta) = \phi_{aa}/\phi_{Aa}$ (e portanto $-1 < \alpha$ e $-1 < \beta$).

- Esboce a transformação para diferentes valores de α e β . Observe que soluções estacionárias são as soluções triviais 0 e 1, e, quando α e β têm o mesmo sinal,

$$\bar{p} = \frac{|\beta|}{|\alpha| + |\beta|}.$$

- Discuta o comportamento assintótico da frequência p_n quando α e β têm sinais opostos. Mostre que na população assintótica apenas sobrevive o alelo favorecido.

- Mostre que, quando $\alpha > 0$ e $\beta > 0$ (ou seja, os genótipos AA e aa têm uma vantagem competitiva em relação ao genótipo Aa), o estado estacionário $\bar{p}$ é instável, e pequenas perturbações $x_0 = \bar{p} \pm \varepsilon$ do equilíbrio produzem comportamentos assintóticos diferentes, a extinção de A ou a extinção de a , dependendo do sinal (*disruptive selection*).
- Mostre que, quando $\alpha < 0$ e $\beta < 0$ (ou seja, o genótipo Aa é o favorecido), o estado estacionário $\bar{p}$ é estável, e portanto os dois alelos convivem na população assintótica (*heterosis*).

⁵R.A. Fisher, *Genetical Theory of Natural Selection*, Clarendon 1930. S. Wright, *Evolution in Mendelian populations*, *Genetics* **16** (1931), 97-159. J.B.S. Haldane, *A Mathematical Theory of Natural and Artificial Selection* (1924-1934).

5. (solução analítica do problema de Fibonacci) Considere a equação às diferenças finitas

$$x_{n+2} = x_{n+1} + x_n.$$

- Faça a conjectura $x_n = \lambda^n$, substitua a conjectura na equação, e determine os dois possíveis valores de λ , baptizando-os λ_+ e λ_- .
- Sendo a equação linear, também uma combinação linear

$$x_n = c_+ \lambda_+^n + c_- \lambda_-^n,$$

com $c_{\pm}$ constantes, é solução. Determine os valores dos parâmetros $c_{\pm}$ de maneira tal que $x_0 = 1$ e $x_1 = 1$.

6. (modelos discreto presas-predadores) Um modelo discreto de um sistema presas-predadores é

$$\begin{aligned}x_{n+1} &= \alpha x_n - \beta x_n y_n \\ y_{n+1} &= -\gamma y_n + \delta x_n y_n\end{aligned}$$

e outro modelo é

$$\begin{aligned}x_{n+1} &= \lambda x_n (1 - x_n) - \beta x_n y_n \\ y_{n+1} &= \delta x_n y_n\end{aligned}$$

Nos dois casos, x_n e y_n são as populações relativas das presas e dos predadores, respectivamente, no tempo n , e as letras gregas são parâmetros.

- Discuta o significado dos parâmetros dos modelos, e as diferenças entre os dois modelos.
- Determine os pontos estacionários.
- Simule as soluções dos sistemas ao variar os parâmetros.

3 Cálculo diferencial e aplicações

1. (movimento retilíneo uniforme) A lei do movimento retilíneo uniforme num referencial inercial é

$$x(t) = x_0 + v_0 t,$$

onde $x(t)$ denota a posição no tempo t , v_0 a velocidade e x_0 a posição inicial.

- Determine a velocidade média no intervalo de tempos entre t e $t + \varepsilon$, e a velocidade instantânea no tempo t .
 - Determine a lei horária de uma partícula que viaja com velocidade de 3 m/s e que no instante $t = 10$ s está na posição $x = 10$ m. Quando estava na origem?
2. (Aquiles e a tartaruga) Aquiles começa a correr com velocidade de 1 m/s em direcção de uma tartaruga que a sua vez foge com velocidade de 0.1 m/s. A distância inicial entre Aquiles e a tartaruga é de 100 m.

- Determine quanto tempo demora Aquiles a percorrer $1/2$, $1/2 + 1/4$, $1/2 + 1/4 + 1/8$, ..., da distância inicial, e passado quanto tempo chega ao ponto onde estava inicialmente a tartaruga.
- Determine a distância $d(t)$ entre Aquiles e a tartaruga no tempo t .
- Aquiles alcança a tartaruga? Se sim, em quanto tempo?

3. (queda livre) A queda livre de uma partícula próxima da superfície terrestre é modelada pela lei horária

$$r(t) = r_0 + v_0 t - \frac{1}{2} g t^2,$$

onde $r(t)$ é a altura no tempo t , r_0 é a altura inicial, v_0 é velocidade inicial, e $g \simeq 980$ cm/s² é a aceleração da gravidade próximo da superfície terrestre.

- Determine a velocidade média no intervalo de tempos entre t e $t + \varepsilon$, e a velocidade instantânea no tempo t .
 - Uma pedra é deixada cair do topo da torre de Pisa, que tem $\simeq 56$ metros de altura, com velocidade inicial nula. Calcule a altura da pedra após 1 segundo, o tempo necessário para a pedra atingir o chão e a sua velocidade no instante do impacto.
 - Com que velocidade inicial deve uma pedra ser atirada para cima de forma a atingir a altura de 20 metros, relativamente ao ponto inicial?
 - Com que velocidade inicial deve uma pedra ser atirada para cima de forma a voltar de novo ao ponto de partida ao fim de 10 segundos?
4. (derivada) A derivada da função $f(x)$ no ponto x é o limite

$$f'(x) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{f(x+\varepsilon) - f(x)}{\varepsilon}$$

Ou seja, se f tem derivada no ponto x , então vale a aproximação linear

$$f(x + \varepsilon) - f(x) = f'(x) \cdot \varepsilon + r(\varepsilon)$$

onde o “resto” $r(\varepsilon)$ é tal que $\frac{r(\varepsilon)}{\varepsilon} \rightarrow 0$ quando $\varepsilon \rightarrow 0$.

A notação de Leibniz para a derivada f' é $\frac{df}{dx}$, ou $\frac{d}{dx} f$, ou $\frac{dy}{dx}$ se $y = f(x)$.

A derivada segunda de f é a derivada da derivada, ou seja, $f'' = (f')'$, ...

- Calcule as derivadas $f'(x)$ e $f''(x)$ de cada uma das seguintes funções $f(x)$ nos pontos onde existem.

$$f(x) = 2x - 3 \quad f(x) = x^2 \quad f(x) = |x| \quad f(x) = \begin{cases} \frac{x}{|x|} & \text{se } x \neq 0 \\ 0 & \text{se } x = 0 \end{cases}$$

5. (derivadas elementares e regras) Derivadas elementares são

$$\frac{d}{dx} \text{constante} = 0, \quad \frac{d}{dx} x^n = nx^{n-1}, \quad \frac{d}{dx} x^{1/n} = \frac{1}{n} x^{-1+1/n}, \quad \sin' = \cos, \quad \cos' = -\sin$$

A derivada é linear, ou seja

$$(\lambda f)' = \lambda f' \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}, \quad (f + g)' = f' + g'$$

e satisfaz as regras (regra de Leibniz e derivação de um quociente)

$$(fg)' = f'g + fg', \quad (f/g)' = \frac{f'g - fg'}{g^2} \quad \text{nos pontos onde } g \neq 0$$

- Calcule a derivada $f'(x)$ de cada uma das seguintes funções $f(x)$ nos pontos onde podem ser definidas.

$$\begin{array}{lll} f(x) = 3x & f(x) = x \sin(x) & f(x) = 17 \\ f(x) = x^3 - 3x + 1 & f(x) = \sqrt{x} & f(x) = x^{-1} - x^{5/3} \\ f(x) = \frac{1}{x} & f(x) = \frac{x-1}{x^3+2} & f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} \\ \tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)} & \sec(x) = \frac{1}{\cos(x)} & \operatorname{cosec}(x) = \frac{1}{\sin(x)} \end{array}$$

- Calcule as derivadas $P'(0), P''(0), P'''(0), \dots, P^{(n)}(0), P^{(n+1)}(0)$, de um polinómio

$$P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n.$$

6. (aproximação linear) Estime os seguintes valores, usando a aproximação linear

$$f(x + \varepsilon) \simeq f(x) + f'(x) \cdot \varepsilon$$

$$\sin(0.01) \quad \sqrt{1.1} \quad \cos(\pi - 0.03) \quad \frac{1}{1 + 0.001}$$

7. (derivação de função composta: regra da cadeia) A derivada da função composta $(f \circ g)(x) = f(g(x))$ é

$$(f \circ g)'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x).$$

- Calcule a derivada $f'(x)$ de cada uma das seguintes funções $f(x)$ nos pontos onde podem ser definidas.

$$\begin{array}{lll} f(x) = \cos(x^2) & f(x) = \sqrt{2x-1} & f(x) = \sin(\sqrt{x}) \\ f(x) = (\sin(x))^2 & f(x) = \sin(\cos(x^3)) & f(x) = \frac{\cos(2x) - x}{\sqrt{x}} \end{array}$$

8. (Derivação de função inversa) Se $h(y)$ é a função inversa de $f(x)$, ou seja, $h(f(x)) = x$ e $f(h(y)) = y$, então

$$h'(y) = 1/f'(h(y))$$

- Calcule as derivadas das seguintes funções nos pontos onde podem ser definidas.

$$f(x) = \arcsin(x) \quad f(x) = \arccos(x) \quad f(x) = \arctan(x)$$

- Calcule a derivada da função inversa de $f(x) = x + x^3$ no ponto $y = 0$.

9. (taxas de variação) Determine a taxa de variação

- $\frac{dA}{dr}$, onde A é a área de uma circunferência e r o seu raio,
- $\frac{dV}{dr}$, onde V é o volume de uma bola e r o seu raio,
- $\frac{dV}{d\ell}$, onde V é o volume de um cubo e ℓ o seu lado.

10. (vida e morte de um cacto) Um cacto tem forma esférica. Cresce absorvendo material através da sua superfície, a uma taxa $v = 0.1 \text{ gr/s}\cdot\text{cm}^2$.
- Determine a taxa de crescimento do raio r do cacto, na hipótese em que a sua densidade $\rho = 4 \text{ gr/cm}^3$ é constante. Deduza a lei horária $r(t)$ sabendo que $r(0) = 2 \text{ cm}$.
 - Passado quanto tempo o cacto duplica o seu volume?

Em condições óptimas, um cacto adulto contém 0.9 gr/cm^3 de água, e morre quando a água disponível é menor de 0.09 gr/cm^3 . Num período seco, o cacto adulto perde água através da superfície, a uma taxa $p = 0.001 \text{ gr/s}$.

- Determine quanto tempo vive um cacto de raio $r = 10 \text{ cm}$ durante uma seca.
 - Um cacto menor sobrevive mais?
11. (teorema e desigualdade do valor médio) O teorema do valor médio diz que se f é uma função contínua no intervalo $[a, b]$, e diferenciável no seu interior (a, b) , então existe um ponto $c \in (a, b)$ tal que

$$f(b) - f(a) = f'(c) \cdot (b - a).$$

Em particular, se $|f'(c)| \leq \lambda$ para todo o $c \in (a, b)$, então vale a desigualdade

$$|f(b) - f(a)| \leq \lambda \cdot |b - a|.$$

- Mostre que, se $f(x)$ é um polinómio de segundo grau, então a recta que une os pontos $(a, f(a))$ e $(b, f(b))$ é paralela à recta tangente ao gráfico de f no ponto médio $\frac{a+b}{2}$.
- Mostre que para todos os x e y

$$|\sin(x) - \sin(y)| \leq |x - y|$$

- Mostre que para todos $0 < y \leq x$

$$ny^{n-1}(x - y) \leq x^n - y^n \leq nx^{n-1}(x - y)$$

12. (estudo de funções, máximos e mínimos) Uma função diferenciável $f(x)$ é crescente nos intervalos onde $f'(x) > 0$, decrescente nos intervalos onde $f'(x) < 0$, constante nos intervalos onde $f'(x) = 0$. Se a é um ponto de máximo o mínimo local da função diferenciável $f(x)$ definida numa sua vizinhança, então a é um *ponto crítico* de $f(x)$, ou seja, $f'(a) = 0$.

- Esboce os gráficos das seguintes funções, definidas em oportunos domínios.

$$f(x) = 1 - \frac{x^2}{2} \quad f(x) = x + \frac{1}{x} \quad f(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2}$$

$$f(x) = \frac{1}{(x-1)(x-2)} \quad f(x) = (x-1)(x-2)(x-3)$$

$$f(x) = x - \sin(x) \quad f(x) = \sin(x) + \sin(2x) \quad f(x) = \frac{\sin(x)}{x}$$

- Mostre que, entre todos os rectângulos de perímetro P fixado, o quadrado é o que tem área maior.
- Mostre que, dados n números $a_1, a_2, \dots, a_n$, o valor de x que minimiza a soma dos “erros quadráticos”

$$(x - a_1)^2 + (x - a_2)^2 + \dots + (x - a_n)^2$$

é a média aritmética

$$\bar{x} = \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}.$$

Referências

[Apostol] Tom M. Apostol, *Calculus*, John Wiley & Sons, New York 1969.

4 Área, integral e métodos de integração

- (área do segmento parabólico segundo Eudoxo e Arquimedes) O método de exaustão, utilizado por Eudoxo e Arquimedes, para calcular a área de uma figura geométrica consiste em aproximar a região com reuniões de figuras simples, como rectângulos e triângulos. Por exemplo, a área do “segmento parabólico”

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \text{ t.q. } 0 \leq x \leq 1 \text{ e } 0 \leq y \leq x^2\},$$

pode ser aproximada dividindo o intervalo $[0, 1]$ em n subintervalos de comprimento $1/n$, e observando que $\text{área}(A)$ é superior à soma $s_n(A)$ das áreas dos rectângulos de bases $[\frac{k}{n}, \frac{k+1}{n}]$ e alturas $(k/n)^2$, e inferior à soma $S_n(A)$ das áreas dos rectângulos de bases $[\frac{k}{n}, \frac{k+1}{n}]$ e alturas $((k+1)/n)^2$, onde $k = 0, 1, 2, \dots, n-1$. Ou seja,

$$\sum_{k=0}^{n-1} \frac{k^2}{n^3} = s_n(A) \leq \text{área}(A) \leq S_n(A) = \sum_{k=1}^n \frac{k^2}{n^3}$$

- Mostre que a diferença $S_n(A) - s_n(A) \rightarrow 0$ quando $n \rightarrow \infty$.
- Use a identidade

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n^3}{3} + \frac{n^2}{2} + \frac{n}{6}$$

para mostrar que, quando $n \rightarrow \infty$, as aproximações $s_n(A)$ e $S_n(A)$ convergem para $1/3$.

- (área e integral) Se $f(x)$ é uma função contínua e não-negativa, definida no intervalo $[a, b]$, o “integral de $f(x)$ entre os pontos a e b ” representa a área da região

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \text{ t.q. } a \leq x \leq b \text{ e } 0 \leq y \leq f(x)\}$$

limitada pelo eixo dos x , as rectas verticais $x = a$ e $x = b$, e o gráfico da função f . A notação é

$$\int_a^b f(x) dx = \text{área}(A)$$

Algumas propriedades elementares do integral são

$$\int_a^b f(x) dx = -\int_b^a f(x) dx, \quad \int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

$$\int_a^b (f(x) + g(x)) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx, \quad \int_a^b \lambda \cdot f(x) dx = \lambda \cdot \int_a^b f(x) dx \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}$$

$$\int_a^b f(x)dx = \int_{a+c}^{b+c} f(x-c)dx \quad \forall c \in \mathbb{R}, \quad \int_{ka}^{kb} f\left(\frac{x}{k}\right)dx = k \int_a^b f(x)dx \quad \forall k > 0$$

$$f(x) \leq g(x) \quad \forall x \in [a, b] \quad \Rightarrow \quad \int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b g(x)dx$$

$$m \leq f(x) \leq M \quad \forall x \in [a, b] \quad \Rightarrow \quad m \cdot (b-a) \leq \int_a^b f(x)dx \leq M \cdot (b-a)$$

- Calcule os integrais⁶

$$\int_0^1 3dx \quad \int_{-2}^2 7dx \quad \int_1^{10} xdx \quad \int_{-2}^3 (-2x)dx$$

$$\int_{-2}^2 |x|dx \quad \int_0^3 (5x-2)dx \quad \int_{-33}^{33} (11-x)dx \quad \int_0^n [x]dx$$

3. (**primitivas e cálculo de integrais**) A função $F(x)$ é uma *primitiva* da função contínua $f(x)$ se $F'(x) = f(x)$. A notação de Leibniz é $F(x) = \int f(x)dx$. Duas primitivas $F(x)$ e $G(x)$ de $f(x)$ diferem por uma constante, pois a derivada da diferença é $F'(x) - G'(x) = 0$.

O *teorema fundamental do cálculo* (Leibniz e Newton) diz que $\int_a^x f(u)du$ é uma primitiva de $f(x)$, ou seja,

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(u)du = f(x).$$

Se $F(x)$ é uma primitiva de $f(x)$, então $\int_a^b f(x)dx = [F(x)]_a^b$, ou seja,

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a).$$

- Calcule as seguintes primitivas

$$\int dx \quad \int x^2 dx \quad \int \frac{1}{x^3} dx \quad \int \sqrt{2x-1} dx$$

$$\int (x^2 - 2x + 5)dx \quad \int \sin(\theta)d\theta \quad \int (\cos(\pi x) - 2x^3) dx \quad \int \frac{dx}{\sqrt{x}}$$

$$\int \frac{d\theta}{\cos^2(\theta)} \quad \int \frac{dx}{1+x^2} \quad \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

- Calcule os seguintes integrais

$$\int_0^3 (x-1)dx \quad \int_{-1}^1 (1-|x|)dx \quad \int_0^{10} \sqrt{x}dx \quad \int_{-\pi}^{\pi} \cos(x)dx$$

$$\int_{-3}^2 \sqrt{x^2}dx \quad \int_{-\pi}^{\pi/2} \sin(2x)dx \quad \int_1^2 \frac{1}{x^2}dx \quad \int_3^5 (x^{1/3} - x^{1/5}) dx$$

$$\int_{-5}^5 (1 + 399x - x^2) dx \quad \int_0^{2\pi} |\sin(x)|dx \quad \int_{-1}^1 (33 - 11x)^{66} dx$$

- Calcule a derivada de

$$F(x) = \int_0^x \frac{dt}{1+t^2} \quad F(x) = \int_0^{x^2} \sin(t)dt \quad F(x) = \int_{2x}^{x^3} (t-t^2)dt$$

- Calcule a área da região do plano limitada entre as curvas

$$y = x^2 \quad \text{e} \quad y = x^3, \quad \text{com } 0 \leq x \leq 1$$

$$y = \sin(x) \quad \text{e} \quad y = -\sin(x), \quad \text{com } 0 \leq x \leq \pi$$

$$y = x^{1/3} \quad \text{e} \quad y = x^{1/2}, \quad \text{com } 0 \leq x \leq 1$$

⁶ $[x]$ denota a “parte inteira de x ”, ou seja, o único inteiro $n \in \mathbb{Z}$ tal que $n \leq x < n+1$.

4. (logaritmo e exponencial) O *logaritmo* é a função $\log : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ definida pelo integral

$$\log(x) = \int_1^x \frac{dt}{t}$$

para $x \in \mathbb{R}_+ =]0, \infty[$.

- Observe que a derivada do logaritmo é

$$\log'(x) = \frac{1}{x}$$

e deduz que o logaritmo é estritamente crescente.

- Mostre que $\log(1) = 0$, e que

$$\log(xy) = \log(x) + \log(y) \quad \text{e} \quad \log(1/x) = -\log(x) \quad \forall x, y \in \mathbb{R}_+$$

- Deduza que $\log(\mathbb{R}_+) = \mathbb{R}$, e esboce o gráfico do logaritmo.

O *exponencial* é a função inversa do logaritmo, ou seja, a função $\exp : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+$ tal que

$$\exp(\log x) = x \quad \forall x \in \mathbb{R}_+, \quad \log(\exp(y)) = y \quad \forall y \in \mathbb{R}$$

O valor $\exp(x)$ é também denotado por e^x , onde $e = \exp(1)$ (ou seja, $\log(e) = 1$).

- Mostre que a derivada do exponencial é o exponencial, ou seja,

$$\exp'(x) = \exp(x).$$

- Mostre que $\exp(0) = 1$, e que

$$\exp(x + y) = \exp(x) \exp(y) \quad \text{e} \quad \exp(-x) = 1/\exp(x) \quad \forall x, y \in \mathbb{R}$$

- Esboce o gráfico do exponencial.

Gráficos do logaritmo (vermelho) e do exponencial (verde).

5. (integrais com exponenciais e logaritmos) Calcule

$$\int_2^3 \frac{dx}{x} \quad \int_{\log 1}^{\log 2} e^x dx \quad \int \frac{dx}{x-1} \quad \int_1^2 e^{x-1} dx$$

$$\int 2e^{3x} dx \quad \int_0^7 e^{-x} dx \quad \int \frac{1}{x(1-x)} dx$$

6. (integração por substituição) A substituição $y = g(x)$, donde $dy = g'(x)dx$, transforma $f(g(x))g'(x)dx$ em $f(y)dy$, portanto

$$\int_a^b f(g(x))g'(x)dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(y)dy$$

- Calcule

$$\int_0^1 xe^{x^2} dx \quad \int \frac{\cos(\log x)}{x} dx \quad \int \frac{\cos(\theta)}{\sqrt{5+2\sin(\theta)}} d\theta \quad \int \tan(\theta) d\theta$$

$$\int 3x^2 \cos(x^3) dx \quad \int_{\pi}^{2\pi} \frac{\sin(\sqrt{x})}{\sqrt{x}} dx \quad \int_{-1/2}^{1/2} \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

$$\int \cos(x)e^{\sin(x)} dx \quad \int \frac{x}{x^2-1} dx \quad \int_{\log 1}^{\log 2} \frac{e^x}{\sqrt{1+e^x}} dx \quad \int \frac{\sin(\sqrt{x})}{\sqrt{x}} dx$$

7. (integração por partes) Pela regra de Leibniz, a derivada de fg é $(fg)' = f'g + fg'$, portanto

$$\int_a^b f(x)g'(x)dx = [f(x)g(x)]_a^b - \int_a^b f'(x)g(x)dx$$

- Calcule

$$\int_0^1 xe^{-x} dx \quad \int \sin(\log(x)) dx \quad \int_1^{e^3} \log(x) dx$$

$$\int x \cos(x) dx \quad \int x^2 \sin(x) \quad \int e^x \sin(x) dx$$

8. (velocidade + condição inicial $\Rightarrow$ lei horária) Uma partícula é deslocada ao longo de uma recta com velocidade $v(t) = t - t^2$ no tempo t .

- Determine a posição $q(2)$ da partícula no tempo $t = 2$ sabendo que a sua posição inicial é $q(0) = 1$.

9. (trabalho de expansão) O trabalho efectuado por um gás perfeito numa expansão do volume V_0 ao volume V_1 é dado pelo integral

$$L = \int_{V_0}^{V_1} p dV$$

onde p é a pressão.

- Calcule o trabalho efectuado por um gás que expande de 3 l até 4 l a uma pressão constante de 2 atm.
- Calcule o trabalho efectuado por 1 mole de oxigénio que expande isotermicamente, à temperatura de 20 °C, de 1 l até 2 l (a equação de estado de gás perfeito é $pV = nRT$, onde n é o número de moles, $R \simeq 8.314 \times 10^7$ J/K mol, e T é a temperatura absoluta).

Referências

[Apostol] Tom M. Apostol, *Calculus*, John Wiley & Sons, New York 1969.

Formulário primitivas

	(função)	(“uma” primitiva)
	$f(x) = F'(x)$	$\int f(x)dx = F(x)$
(por substituição)	$f(y(x))y'(x)$	$\int f(y(x))y'(x)dx = \int f(y)dy$
(por partes)	$f(x)g'(x)$	$\int f(x)g'(x)dx = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x)dx$
(constantes)	λ	$\int \lambda dx = \lambda x$
(potências, $\alpha \neq -1$)	x^α	$\int x^\alpha dx = \frac{1}{\alpha+1}x^{\alpha+1}$
(logaritmo)	$1/x$	$\int \frac{dx}{x} = \log x $
(exponencial)	e^x	$\int e^x dx = e^x$
(seno)	$\sin(x)$	$\int \sin(x)dx = -\cos(x)$
(coseno)	$\cos(x)$	$\int \cos(x)dx = \sin(x)$
(tangente)	$\frac{1}{\cos^2(x)}$	$\int \frac{dx}{\cos^2(x)} = \tan(x)$
(cotangente)	$\frac{1}{\sin^2(x)}$	$\int \frac{dx}{\sin^2(x)} = -\cotan(x)$
(arco cujo seno)	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin(x)$
(arco cuja tangente)	$\frac{1}{1+x^2}$	$\int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan(x)$
(exponencial $\times$ seno)	$e^{\alpha x} \sin(\beta x)$	$\int e^{\alpha x} \sin(\beta x)dx = \frac{e^{\alpha x}(\alpha \sin(\beta x) - \beta \cos(\beta x))}{\alpha^2 + \beta^2}$
(exponencial $\times$ coseno)	$e^{\alpha x} \cos(\beta x)$	$\int e^{\alpha x} \cos(\beta x)dx = \frac{e^{\alpha x}(\alpha \cos(\beta x) + \beta \sin(\beta x))}{\alpha^2 + \beta^2}$

5 Equações diferenciais ordinárias

- (equações diferenciais ordinárias)** Uma *equação diferencial ordinária (EDO)* de primeira ordem é uma “lei”

$$\dot{x} = v(t, x)$$

para a trajectória $t \mapsto x(t) \in \mathbb{R}$ de um sistema dinâmico, onde $\dot{x} = \frac{d}{dt}x(t)$ denota a derivada do observável x em ordem ao tempo t , e $v(t, x)$ é um “campo de direcções” (uma recta com declive $v(t, x)$ para cada ponto (t, x)). Uma *solução* da EDO é uma função $t \mapsto x(t)$ tal que $\dot{x}(t) = v(t, x(t))$ para cada tempo t num certo intervalo, ou seja, uma função cujo gráfico é tangente ao campo de direcções em cada ponto $(t, x(t))$ do gráfico. Se o campo $v(t, x)$ é suficientemente regular (por exemplo, diferenciável), para cada ponto (t_0, x_0) passa uma única solução com condição inicial $x(t_0) = x_0$.

Campos de direcções e algumas soluções de $\dot{x} = \sin(t) - x$ e de $\dot{x} = x(1 - x)$.

- Esboce os campos de direcções das EDOs

$$\begin{aligned} \dot{x} = t & \quad \dot{x} = -x & \quad \dot{x} = x - 1 & \quad \dot{x} = x + t \\ \dot{x} = x(1 - x) & \quad \dot{x} = (x - 1)(x - 2)(x - 3) \end{aligned}$$

e conjecture sobre o comportamento das soluções.

- A função $x(t) = t^3$ é solução da equação diferencial $t\dot{x} - 3x = 0$? E a função $x(t) = 0$?
- (Integração de EDOs simples)** O teorema fundamental do cálculo implica que a solução de uma EDO simples

$$\dot{x} = v(t)$$

com condição inicial $x(t_0) = x_0$ é determinada por meio de uma integração, ou seja,

$$\dot{x} = v(t), \quad x(t_0) = x_0 \quad \Rightarrow \quad x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t v(s) ds$$

- Integre (ou seja, determine soluções com $x(t_0) = x_0$) as seguintes EDOs.

$$\dot{x} = 2 \sin(t) \quad \dot{x} = e^{-t} \quad \dot{x} = \cos(3t) \quad \dot{x} = t - t^2$$

- (EDOs autónomas)** A solução de uma EDO *autónoma*

$$\dot{x} = v(x)$$

depende da condição inicial $x(t_0) = x_0$. Se x_0 é um *ponto singular* de $v(x)$, i.e. se $v(x_0) = 0$, então $x(t) = x_0$ é uma solução *estacionária* (ou de *equilíbrio*) da equação. Se x_0 não é um ponto singular, i.e. se $v(x_0) \neq 0$, então a receita para resolver $\frac{dx}{dt} = v(x)$ consiste em “separar as variáveis”, $\frac{dx}{v(x)} = dt$, integrar os dois membros, $\int_{x_0}^x \frac{dy}{v(y)} = \int_{t_0}^t ds$, e resolver para x . Ou seja,

$$\dot{x} = v(x), \quad x(t_0) = x_0 \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} x(t) = x_0 & \text{se } v(x_0) = 0 \\ \int_{x_0}^x \frac{dy}{v(y)} = t - t_0 & \text{se } v(x_0) \neq 0 \end{cases}$$

- Considere as seguintes EDOs de primeira ordem

$$\dot{x} = -3x \quad \dot{x} = 2x \quad \dot{x} = x - 1 \quad \dot{x} = e^x \quad \dot{x} = (x - 1)(x - 2)$$

Determine as soluções estacionárias. Esboce os campos de direcções e conjecture sobre o comportamento das soluções. Determine, se possível, fórmulas para a solução com condição inicial $x(0) = x_0$, e esboce o gráfico de algumas das soluções encontradas.

4. (EDOs separáveis) A solução de uma EDO *separável*

$$\dot{x} = \frac{f(x)}{g(t)}$$

com condição inicial $x(t_0) = x_0$, se $f(x_0) \neq 0$ e $g(t_0) \neq 0$, é dada em forma implícita por

$$\boxed{\dot{x} = f(x)/g(t), x(t_0) = x_0 \quad \Rightarrow \quad \int_{x_0}^x \frac{dy}{f(y)} = \int_{t_0}^t \frac{ds}{g(s)}}$$

- Resolva as seguintes EDOs separáveis

$$\begin{array}{llll} \dot{x} = tx^3 & t\dot{x} + t = t^2 & \dot{x} = t^3/x^2 & \dot{x} = e^{x+3t^2}t \\ \dot{x} = \frac{t-1}{x^2} & \frac{x-1}{t}\dot{x} + \frac{x-x^2}{t^2} = 0 & \frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y} & \\ (t^2 + 1)\dot{x} = 2tx & \dot{x} = t(x^2 - x) & \dot{x} = e^{t-x}, & \end{array}$$

definidas em oportunos domínios.

5. (EDOs lineares) A solução de uma EDO *linear*

$$\dot{x} + p(t)x = q(t),$$

com condição inicial $x(t_0) = x_0$, pode ser determinada pelos seguintes dois passos: determinar (apenas) uma solução não trivial $y(t)$ da “equação homogénea associada”, $\dot{y} + p(t)y = 0$, substituir a conjectura $x(t) = \lambda(t)y(t)$ na equação não-homogénea e resolver para $\lambda(t)$. O resultado é

$$\boxed{\dot{x} + p(t)x = q(t), x(t_0) = x_0 \quad \Rightarrow \quad x(t) = e^{-\int_{t_0}^t p(u)du} \left(x_0 + \int_{t_0}^t e^{\int_{t_0}^s p(u)du} q(s)ds \right) .}$$

- Determine a solução geral das EDOs lineares de primeira ordem

$$2\dot{x} - 6x = e^{2t} \quad \dot{x} + 2x = t \quad \dot{x} + x/t^2 = 1/t^2 \quad \dot{x} + tx = t^2$$

definidas em oportunos intervalos da recta real.

- Resolva os seguintes problemas nos intervalos indicados:

$$\begin{array}{ll} 2\dot{x} - 3x = e^{2t} & t \in (-\infty, \infty) \quad \text{com } x(0) = 1 \\ \dot{x} + x = e^{3t} & t \in (-\infty, \infty) \quad \text{com } x(1) = 2 \\ t\dot{x} - x = t^3 & t \in (0, \infty) \quad \text{com } x(1) = 3 \\ \dot{x} + tx = t^3 & t \in (-\infty, \infty) \quad \text{com } x(0) = 0 \\ dr/d\theta + r \tan \theta = \cos \theta & t \in (-\pi/2, \pi/2) \quad \text{com } r(0) = 1 \end{array}$$

Referências

[Apostol] Tom M. Apostol, *Calculus*, John Wiley & Sons, New York 1969.

[Robinson] J.C. Robinson, *An introduction to ordinary differential equations*, Cambridge University Press, Cambridge 2004.

6 Modelos contínuos

1. (**queda livre**) A queda livre de uma partícula próxima da superfície terrestre é modelada pela equação de Newton

$$m\ddot{r} = -mg$$

onde r é a altura, m é a massa da partícula, $g \simeq 980 \text{ cm/s}^2$ é a aceleração da gravidade próximo da superfície terrestre, e $\ddot{r}$ denota a segunda derivada de r em ordem ao tempo t .

- Resolva a equação $m\dot{v} = -mg$ para a velocidade $v = \dot{r}$, com condição inicial $v(0) = v_0$, e deduza a solução $r(t)$ com condição inicial $r(0) = r_0$.
2. (**decaimento radioactivo**) A taxa de decaimento de matéria radioactiva é proporcional à quantidade de matéria existente. Quer isto dizer que a quantidade $N(t)$ de matéria radioactiva existente no instante t satisfaz a EDO de primeira ordem

$$\dot{N} = -\beta N$$

onde $\beta > 0$ é uma constante de decaimento.

- Determine a solução da equação diferencial com condição inicial $N(0) = N_0$.
- O tempo de *meia-vida* de uma matéria radioactiva é o tempo necessário até a quantidade de matéria se reduzir a metade da quantidade inicial, isto é, é o tempo T tal que $N(T)/N(0) = 1/2$. Encontre a relação entre o tempo de meia-vida T e a constante de decaimento β , e mostre que o tempo de meia-vida não depende da quantidade inicial $N(0)$.
- O tempo $1/\beta$ é dito *vida média*, sendo a esperança do tempo de vida de cada núcleo. Determine o tempo de meia-vida do ^{14}C sabendo que a vida média é $1/\beta \simeq 8033$ anos. .
- A radiação cósmica produz ^{14}C na atmosfera terrestre a uma certa taxa α . Portanto, o número de núcleos de ^{14}C na atmosfera segue a EDO

$$\dot{N} = -\beta N + \alpha$$

Mostre que $N(t)$ converge para o valor estacionário $\bar{N} = \alpha/\beta$ quando $t \rightarrow \infty$, independentemente da condição inicial $N(0)$.

Campo de direcções e soluções da equação $\dot{x} = -2x + 1$.

3. (**crescimento exponencial**) O crescimento de uma população num meio ambiente ilimitado é modelado pela EDO de primeira ordem

$$\dot{N} = \lambda N$$

onde $N(t)$ é a população no tempo t , e $\lambda > 0$.

- Determine a solução com condição inicial $N(0) = N_0 > 0$.
- O que acontece à solução para grandes intervalos de tempo?
- Se a população de uma bactéria duplica numa hora, quanto aumentará em duas horas?

- Se de uma população que cresce exponencialmente é retirada uma parte a uma taxa constante $\alpha > 0$, então

$$\dot{N} = \lambda N - \alpha$$

Determine o estado estacionário, e discuta o comportamento assintótico das outras soluções.

Campo de direcções e soluções da equação $\dot{x} = 2x - 1$.

4. (equação logística) Um modelo mais realista da dinâmica de uma população num meio ambiente limitado é a *equação logística*⁷

$$\dot{N} = \lambda N(1 - N/M)$$

onde $\lambda > 0$ e a constante $M > 0$ é a população máxima suportada pelo meio ambiente. Observe que $\dot{N} \simeq \lambda N$ se $N \ll M$, e que $\dot{N} \rightarrow 0$ quando $N \rightarrow M$.

- Seja $x(t) = N(t)/M$ a população relativa. Mostre que a função $x(t)$ satisfaz a equação logística “adimensional”

$$\dot{x} = \lambda x(1 - x).$$

- Determine as soluções de equilíbrio da equação logística.
- Verifique que

$$x(t) = \frac{1}{1 + \left(\frac{1}{x_0} - 1\right) e^{-\lambda t}},$$

é a solução da equação logística com condição inicial $x(0) = x_0 \in (0, 1)$.

- Discuta o comportamento assintótico das soluções da equação logística.

Campo de direcções e soluções da equação logística.

⁷Pierre François Verhulst, Notice sur la loi que la population poursuit dans son accroissement, *Correspondance mathématique et physique* **10** (1838), 113-121.

5. (crescimento super-exponencial) Um outro modelo de dinâmica populacional em meio ilimitado é

$$\dot{N} = \alpha N^2.$$

- Determine a solução com condição inicial $N(0) = N_0 > 0$.
- Observe que as soluções que determinou não estão definidas para todos os tempos: este modelo prevê uma catástrofe (população infinita) após um intervalo de tempo finito!

Campo de direcções e soluções da equação $\dot{x} = x^2$.

6. (reação simples) Considere a reacção

entre duas espécies químicas A e B . Assuma que as velocidades⁸ sejam dadas por $v_{\rightarrow} = k_{\rightarrow}[A]$ e $v_{\leftarrow} = k_{\leftarrow}[B]$, onde $[A]$ e $[B]$ são as concentrações de A e B , respectivamente, e $k_{\rightarrow}$ e $k_{\leftarrow}$ são constantes.

- As concentrações ao equilíbrio verificam

$$[B]_e/[A]_e = k_{\rightarrow}/k_{\leftarrow}$$

Deduzas as concentrações de A e B no equilíbrio, sabendo que as concentrações iniciais são $[A]_0 = N$ e $[B]_0 = 0$.

- Mostre que $x = [A] - [A]_e$ satisfaz a equação diferencial

$$\dot{x} = -(k_{\rightarrow} + k_{\leftarrow})x$$

e calcule $x(t)$ dado um valor inicial $x(0)$.

- Mostre como estimar as velocidades de reacção, $k_{\rightarrow}$ e $k_{\leftarrow}$, utilizando as observações de $[A]_t$ e $[B]_t$.

⁸Segundo a *lei de ação das massas*, “numa dada temperatura, a velocidade de uma reacção química é proporcional ao produto das concentrações molares dos reagentes, elevadas a expoentes iguais aos respectivos coeficientes da equação química balanceada”. Por exemplo, a velocidade da reacção

é dada por

$$v_{\rightarrow} = K_T^{\rightarrow} [A]^a [B]^b \dots$$

onde $[A]$, $[B]$, ... são as concentrações molares de A , B , ... , e $K_T^{\rightarrow}$ é uma constante (que pode depender da temperatura T , por exemplo, segundo a *lei de Arrhenius* $K_T = Ae^{-E/RT}$, com A e E constantes). A velocidade da reacção inversa

é

$$v_{\leftarrow} = K_T^{\leftarrow} [X]^x [Y]^y \dots$$

Então no equilíbrio as concentrações satisfazem a lei

$$\frac{[A]^a [B]^b \dots}{[X]^x [Y]^y \dots} = K_T$$

onde $K_T = K_T^{\leftarrow} / K_T^{\rightarrow}$.

7. (fazer modelos) Escreva equações diferenciais que modelem cada uma das seguintes situações. O que pode dizer sobre as soluções?

- A taxa de variação da temperatura de uma chávena de chá no instante t é proporcional à diferença entre a temperatura do ar e a temperatura do chá no instante t .
- A taxa de variação de uma população de cogumelos no instante t é proporcional à raiz quadrada da população no instante t .
- A velocidade de um foguetão no instante t é inversamente proporcional à altura atingida no instante t .
- A taxa de crescimento da massa de um cristal cúbico é proporcional à sua superfície.

8. (queda livre com atrito) Um modelo mais realista da queda livre de uma partícula próxima da superfície terrestre deve ter em conta a resistência do ar. A resistência é modelada como sendo uma força $-k\dot{r}$ proporcional e contrária à velocidade, assim a equação de Newton escreve-se

$$m\ddot{r} = -k\dot{r} - mg$$

onde $k > 0$ é um coeficiente de atrito. Chamando $v = \dot{r}$ a velocidade da partícula, somos levados a

$$m\dot{v} = -kv - mg$$

- Determine a solução $v(t)$ com condição inicial $v(0) = 0$.
 - Mostre que a velocidade $v(t)$ tende para um valor assintótico v_∞ quando $t \rightarrow \infty$, independentemente do seu valor inicial, e determine este valor.
 - Utilize a solução encontrada para determinar a trajectória $r(t)$ com condição inicial $r(0) = r_0$.
9. (circuito RL) A corrente $I(t)$ num circuito RL, de resistência R e indutância L , é determinada pela EDO

$$L\dot{I} + RI = V$$

onde $V(t)$ é a tensão que alimenta o circuito.

- Escreva a solução geral como função da corrente inicial $I(0) = I_0$.
- Resolva a equação para um circuito alimentado com tensão constante $V(t) = E$. Esboce a representação gráfica de algumas das soluções e diga o que acontece para grandes intervalos de tempo.
- Resolva a equação para um circuito alimentado com uma tensão alternada $V(t) = E \sin(\omega t)$. Se não conseguir, mostre que a solução com $I(0) = 0$ tem a forma

$$I(t) = \frac{E}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}} \sin(\omega t - \alpha) + \frac{E\omega L}{R^2 + \omega^2 L^2} e^{-\frac{R}{L}t}$$

onde α é uma constante que depende de ω , L e R .

10. (lei do arrefecimento de Newton) Numa primeira aproximação, a temperatura $T(t)$ no instante t de um corpo num meio ambiente cuja temperatura no instante t é $M(t)$ segue a lei do arrefecimento de Newton

$$\dot{T} = -k(T - M(t))$$

onde k é uma constante positiva (que depende do material do corpo).

- Escreva a solução $T(t)$ como função da temperatura inicial $T(0) = T_0$ e de $M(s)$ com $0 \leq s \leq t$.
- Resolva a equação quando a temperatura do meio ambiente é mantida constante $M(t) = M$. Esboce a representação gráfica de algumas das soluções e diga o que acontece para grandes intervalos de tempo.
- Uma chávena de café, com temperatura inicial de 100°C , é colocada numa sala cuja temperatura é de 20°C . Sabendo que o café atinge uma temperatura de 60°C em 10 minutos, determine a constante k do café e o tempo necessário para o café atingir a temperatura de 40°C .

7 Curvas e campos escalares

1. (**caminhos e curvas**) Um *caminho*, no plano $\mathbb{R}^2$ ou no espaço $\mathbb{R}^3$, é uma função

$$t \mapsto \vec{r}(t) = (x(t), y(t)) \in \mathbb{R}^2 \quad \text{ou} \quad \vec{r}(t) = (x(t), y(t), z(t)) \in \mathbb{R}^3$$

definida num intervalo (de tempos) $t \in I \subset \mathbb{R}$. A imagem $\gamma = \vec{r}(I) \subset \mathbb{R}^2$ ou $\mathbb{R}^3$ de um caminho contínuo é dita *curva*. A *velocidade* e a *aceleração* do caminho $\vec{r}(t)$ são os caminhos

$$\vec{v}(t) = \frac{d}{dt}\vec{r}(t) = (\dot{x}(t), \dot{y}(t), \dot{z}(t)) \quad \text{e} \quad \vec{a}(t) = \frac{d}{dt}\vec{v}(t) = (\ddot{x}(t), \ddot{y}(t), \ddot{z}(t))$$

respectivamente. A norma⁹ da velocidade, $v(t) = \|\vec{v}(t)\|$, é dita *velocidade escalar*.

As curvas $(e^t \cos(3t), e^t \sin(3t))$, $(t, \sin(1/t))$, e $(2 \cos(t), \sin(-t))$.

- Esboce as seguintes curvas no plano, e calcule velocidade e aceleração, nos pontos onde podem ser definidas.

$$\begin{aligned} \vec{r}(t) &= (t, t^2) & \text{com } t \in \mathbb{R}, & & \vec{r}(t) &= (t^3, t^2) & \text{com } t \in \mathbb{R}, \\ \vec{r}(t) &= (t, |t|) & \text{com } t \in [-1, 1], & & \vec{r}(t) &= (\cos \theta, \sin \theta) & \text{com } \theta \in [0, 2\pi], \\ \vec{r}(t) &= (t, [t]) & \text{com } t \in [-2, 2], & & \vec{r}(t) &= (t, \sin(1/t)) & \text{com } t \in]0, \infty[. \end{aligned}$$

- Verifique que a trajectória $t \mapsto (a \cos t, b \sin t)$, com $t \in \mathbb{R}$ e $a, b > 0$, descreve a elipse $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$.
- Esboce a trajectória $\vec{r}(t) = (R \cos t, R \sin t, bt)$, com $t \in \mathbb{R}$ e $R, b > 0$, descrita por uma partícula em movimento numa *hélice circular*.
- Determine umas equações paramétricas para a parábola $x = y^2 + 1$ e para a hipérbole $x^2 - y^2 = 1$ com $x > 0$ (lembre a identidade $\cosh^2 \theta - \sinh^2 \theta = 1$ entre as funções “hiperbólicas”).

2. (**movimento circular uniforme**) Considere a trajectória

$$t \mapsto \vec{r}(t) = (R \cos(\omega t), R \sin(\omega t)) \quad \text{com } R > 0,$$

descrita por uma partícula em *movimento circular uniforme* no plano.

- Mostre que a partícula descreve uma circunferência de raio R , e determine o período do movimento.
- Calcule a velocidade $\vec{v}(t) = \frac{d}{dt}\vec{r}(t)$ e a aceleração $\vec{a}(t) = \frac{d^2}{dt^2}\vec{r}(t)$, mostre que a aceleração é ortogonal à velocidade e que a aceleração é centrípeta (ou seja, é um vector que aponta para o centro da circunferência).
- Calcule a *velocidade angular*, o quociente entre a velocidade escalar $v(t) = \|\vec{v}(t)\|$ e o raio da circunferência.

⁹A *norma (Euclidiana)* de um vector $\vec{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ é

$$\|\vec{x}\| = \sqrt{\langle \vec{x}, \vec{x} \rangle} = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}, \quad \text{onde} \quad \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n$$

é o *produto interno (Euclidiano)* em $\mathbb{R}^n$. Dois vectores $\vec{x}$ e $\vec{y} \in \mathbb{R}^n$ são *ortogonais* quando $\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = 0$.

3. (**comprimento de uma curva**) O comprimento de uma curva γ , imagem do caminho $\vec{r}: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ com velocidade contínua $\dot{\vec{r}}(t) = \vec{v}(t)$, é dado pelo integral da velocidade escalar,

$$\ell(\gamma) = \int_a^b \|\dot{\vec{r}}(t)\| dt$$

Por exemplo, se a curva é dada por $\vec{r}(t) = (x(t), y(t))$ ou $\vec{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$, o seu comprimento é

$$\int_a^b \sqrt{\dot{x}(t)^2 + \dot{y}(t)^2} dt \quad \text{ou} \quad \int_a^b \sqrt{\dot{x}(t)^2 + \dot{y}(t)^2 + \dot{z}(t)^2} dt.$$

das seguintes curvas no plano:

- Calcule o comprimento do arco de circunferência $(\cos \theta, \sin \theta)$ com $\theta \in [\pi/2, 2\pi]$, da espiral logarítmica $(e^{-t} \cos t, e^{-t} \sin t)$ com $t \in [0, \infty[$, do arco de parábola $(t, t^2/2)$ com $t \in [0, 1]$ (considere a substituição $t = \sinh s$).
- Seja $f(x)$ uma função real com derivada contínua definida no intervalo $[a, b]$. Observe que o gráfico de f , $\Gamma_f = \{(t, f(t)) \mid t \in [a, b]\}$, é a imagem do caminho $t \mapsto (t, f(t))$ com $t \in [a, b]$, e deduza que o seu comprimento é

$$\ell(\Gamma_f) = \int_a^b \sqrt{1 + f'(t)^2} dt.$$

4. (**trajectória de um projectil**) Determine e esboce a trajetória $\vec{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$ de um projectil no espaço $\mathbb{R}^3$ sabendo que a posição inicial é $\vec{r}(0) = (0, 0, 0)$, a velocidade inicial é $\vec{v}(0) = (100, 0, 100)$ cm/s, e que a aceleração verifica a lei de Newton

$$m\vec{a}(t) = (0, 0, -g).$$

onde $m = 10$ g é a massa e $g \simeq 980$ cm/s² a aceleração gravitacional.

5. (**campos escalares, curvas e superfícies de nível**) Sejam $f(x, y)$ uma função real definida num domínio D do plano $\mathbb{R}^2$, e $\lambda \in \mathbb{R}$. A *curva de nível* λ da função f é o conjunto

$$\Sigma_\lambda = \{(x, y) \in D \subset \mathbb{R}^2 \text{ t.q. } f(x, y) = \lambda\}$$

O *gráfico* da função f é

$$\mathcal{G}_f = \{(x, y, z) \in D \times \mathbb{R} \subset \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R} \text{ t.q. } f(x, y) = z\}$$

Curvas de nível e gráfico.

- Esboce as curvas de nível e os gráficos das seguintes funções, nos domínios onde podem ser definidas:

$$\begin{array}{llll} f(x, y) = x + y & f(x, y) = xy & f(x, y) = x^2 + 2y^2 & f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2} \\ f(x, y) = \log(x^2 + y) & f(x, y) = x^2 - y^2 & f(x, y) = \sin(xy) & \end{array}$$

Referências

[Apostol] Tom M. Apostol, *Calculus*, John Wiley & Sons, New York 1969.

8 Derivadas de campos escalares

1. (derivadas parciais, gradientes e derivadas direccionais) As derivadas parciais da função $f(\vec{r}) = f(x, y)$ no ponto $\vec{r} = (x, y)$ são os limites

$$\frac{\partial f}{\partial x}(\vec{r}) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{f(x+\varepsilon, y) - f(x, y)}{\varepsilon} \quad \text{e} \quad \frac{\partial f}{\partial y}(\vec{r}) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{f(x, y+\varepsilon) - f(x, y)}{\varepsilon}$$

O diferencial e o gradiente de $f(x, y)$ no ponto $\vec{r} = (x, y)$ são a “forma linear” e o vector

$$df(\vec{r}) = \frac{\partial f}{\partial x}(\vec{r})dx + \frac{\partial f}{\partial y}(\vec{r})dy \quad \text{e} \quad \vec{\nabla} f(\vec{r}) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(\vec{r}), \frac{\partial f}{\partial y}(\vec{r}) \right)$$

A derivada direccionial de $f(x, y)$ na direcção do vector $\vec{v}$ no ponto $\vec{r}$ é

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{v}}(\vec{r}) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{f(\vec{r} + \varepsilon \vec{v}) - f(\vec{r})}{\varepsilon} = \left\langle \vec{\nabla} f(\vec{r}), \vec{v} \right\rangle$$

Se $t \mapsto \vec{r}(t) = (x(t), y(t))$ é um caminho com velocidade $\vec{v}(t) = (\dot{x}(t), \dot{y}(t))$, e $f(x, y)$ um campo escalar, então a regra da cadeia diz que

$$\frac{d}{dt} f(x(t), y(t)) = \left\langle \vec{\nabla} f(\vec{r}(t)), \vec{v}(t) \right\rangle = \frac{\partial f}{\partial x}(\vec{r}) \cdot \dot{x}(t) + \frac{\partial f}{\partial y}(\vec{r}) \cdot \dot{y}(t)$$

- Considere o campo escalar $f(\vec{r}) = \langle \vec{w}, \vec{r} \rangle$, onde $\vec{w} \in \mathbb{R}^3$.

$$\vec{\nabla} f(\vec{r}) = \vec{w} \quad \text{e} \quad \frac{\partial f}{\partial \vec{v}}(\vec{r}) = \langle \vec{w}, \vec{v} \rangle$$

e que portanto o gradiente de f é constante e igual a $\vec{\nabla} f(\vec{r}) = \vec{w}$.

- Considere o campo escalar $f(\vec{r}) = \|\vec{r}\|^2$. Mostre que

$$\vec{\nabla} f(\vec{r}) = 2\vec{r} \quad \text{e} \quad \frac{\partial f}{\partial \vec{v}}(\vec{r}) = 2 \langle \vec{r}, \vec{v} \rangle.$$

Calcule a derivada direccionial de f no ponto $\vec{r} = (2, 4, 6)$ na direcção do vector $\vec{v} = (1, 2, 3)$. Dado o caminho $\vec{r}(t) = (t, 2t, 3t)$, calcule a derivada de $f(\vec{r}(t))$ em ordem a t no tempo $t = 2$.

- Calcule as derivadas parciais de primeira e segunda ordem das seguintes funções, nos domínios onde podem ser definidas:

$$f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2} \quad f(x, y, z) = x^3 + y^2 + zxy \quad f(x, y) = \log(x^2 + y^2)$$

$$f(x, y) = e^{x+y} \quad f(x, y) = \frac{\sin(x^2)}{y} \quad f(x, y) = x^y$$

- A temperatura do mar num ponto $\vec{r} = (x, y, z)$ é dada por $T(x, y, z) = x^3 - xy + yz^2$. Uma sardinha encontra-se no ponto $\vec{a} = (3, 2, 1)$. Em que direcção e sentido a sardinha tem de nadar para arrefecer mais rapidamente?
- Seja $f(t)$ uma função real diferenciável. Mostre que a função $u(x, y) = f(xy)$ satisfaz a equação

$$x \frac{\partial u}{\partial x} - y \frac{\partial u}{\partial y} = 0$$

e que a função $v(x, y) = f(x/y)$ satisfaz a equação

$$x \frac{\partial v}{\partial x} + y \frac{\partial v}{\partial y} = 0$$

2. (diferencial e aproximação linear) Estime os seguintes valores, usando a aproximação linear

$$f(x + dx, y + dy) \simeq f(x, y) + \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) \cdot dx + \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \cdot dy$$

$$e^{0.01} \sqrt{3.999} \quad \frac{\log(1.01)}{1 + 0.001} \quad {}^3\sqrt{7.99} \sqrt{36.01}$$

3. (energia cinética e sistemas conservativos) Sejam $\vec{q}(t)$ a trajectória de uma partícula de massa m , $\vec{v}(t) = \dot{\vec{q}}(t)$ a sua velocidade e $\vec{a}(t) = \dot{\vec{v}}(t) = \ddot{\vec{q}}(t)$ a sua aceleração.

- Calcule a derivada de $\|\vec{q}(t)\|^2$ em ordem ao tempo t .
- Deduza que, se $\|\vec{q}(t)\|$ é constante, então a velocidade é ortogonal à posição, ou seja

$$\langle \vec{v}(t), \vec{r}(t) \rangle = 0$$

- Mostre que a variação da energia cinética é igual ao produto interno $\langle m\vec{a}(t), \vec{v}(t) \rangle$, ou seja,

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m \|\vec{v}(t)\|^2 \right) = \langle m\vec{a}(t), \vec{v}(t) \rangle .$$

Deduza que se a força $\vec{F} = m\vec{a}$ é ortogonal à velocidade, então a energia cinética é constante.

- As equações de Newton de um sistema conservativo dizem que

$$m\vec{a} = \vec{F},$$

onde $\vec{F} = -\vec{\nabla}V(\vec{q})$, e $V(\vec{q})$ é uma energia potencial. Verifique que a energia

$$E(\vec{q}, \vec{v}) = \frac{1}{2} m \|\vec{v}\|^2 + V(\vec{q})$$

é uma constante do movimento, ou seja, que $\frac{d}{dt} E(\vec{q}(t), \vec{v}(t)) = 0$ ao longo das trajectórias.

4. (recta normal e espaço tangente) Sejam Σ_λ uma curva/superfície de nível do campo escalar $f(\vec{r})$, e $\vec{r}_0 \in \Sigma_\lambda$ um ponto onde $\vec{\nabla}f(\vec{r}_0) \neq 0$. A *recta normal* à superfície Σ_λ no ponto $\vec{r}_0$ é a recta

$$t \mapsto \vec{r}_0 + t \cdot \vec{\nabla}f(\vec{r}_0)$$

O *espaço (recta, plano, ...) tangente* à superfície de nível Σ_λ no ponto $\vec{r}_0$ é o hiperplano ortogonal ao gradiente, definido por

$$\langle \vec{\nabla}f(\vec{r}_0), \vec{r} - \vec{r}_0 \rangle = 0$$

- Considere as seguintes funções:

$$f(x, y) = x^2 + y^2 \quad f(x, y) = x^2 - y^2 \quad f(x, y) = x^2$$

$$f(x, y) = xy \quad f(x, y) = e^{x^2+y^2} \quad f(x, y) = 1 - y - x^2$$

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 \quad f(x, y, z) = x^2 + y^2 - z^2 \quad f(x, y, z) = x^2 + y^2 - z$$

Calcule o gradiente num ponto genérico onde estão definidas.

Determine a recta normal e a recta tangente à curva (ou superfície) de nível no ponto $\vec{r} = (1, 1)$ (ou $\vec{r} = (1, 1, 1)$).

5. (gás perfeito) A equação de estado de um gás perfeito é

$$PV = nRT$$

onde p é a pressão, V o volume, n o número de moles, $R \simeq 8.314 \times 10^7$ J/K·mol, e T é a temperatura absoluta.

- Esboce as curvas “isotermas” (i.e. de temperatura constante) no plano P - V . Descreva o comportamento do volume de um gás perfeito ao variar a pressão, mantendo constante a temperatura.
- Mostre que

$$\left(\frac{\partial P}{\partial V} \right) \cdot \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right) \cdot \left(\frac{\partial T}{\partial P} \right) = -1$$

Referências

[Apostol] Tom M. Apostol, *Calculus*, John Wiley & Sons, New York 1969.

9 Integrais duplos

1. **(integrais duplos e integrais iterados)** O teorema de Fubini afirma que, se $f(x, y)$ é uma função contínua no rectângulo $R = [a, b] \times [c, d]$, então o integral duplo $\iint_R f(x, y) dx dy$ é igual a um dos integrais iterados

$$\begin{aligned} \iint_R f(x, y) dx dy &= \int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) dx \right) dy \\ &= \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx \end{aligned}$$

Se o domínio de integração é uma região $V = \{a \leq x \leq b, g(x) \leq y \leq h(x)\}$, então

$$\iint_V f(x, y) dx dy = \int_a^b \int_{g(x)}^{h(x)} f(x, y) dy dx = \int_a^b \left(\int_{g(x)}^{h(x)} f(x, y) dy \right) dx$$

Se o domínio de integração é uma região $H = \{c \leq y \leq d, g(y) \leq x \leq h(y)\}$, então

$$\iint_H f(x, y) dx dy = \int_c^d \int_{g(y)}^{h(y)} f(x, y) dx dy = \int_c^d \left(\int_{g(y)}^{h(y)} f(x, y) dx \right) dy$$

- Calcule os seguintes integrais iterados.

$$\begin{aligned} \int_0^1 \int_{-1}^1 y dx dy & \quad \int_1^2 \int_0^3 xy^2 dx dy & \quad \int_0^3 \int_1^2 xy^2 dy dx \\ \int_0^e \int_1^{\log(2)} e^x dx dy & \quad \int_0^1 \int_\pi^{2\pi} y \sin(x) dx dy & \quad \int_0^1 \int_\pi^{3\pi} \sin^2(x) dx dy \end{aligned}$$

- Esboce a região de integração e calcule os seguintes integrais duplos recorrendo, se necessário, a uma inversão da ordem de integração.

$$\begin{aligned} \int_0^1 \int_0^y x^3 y dx dy & \quad \int_0^1 \int_{y^3}^{y^2} dx dy & \quad \int_0^3 \int_{x^2}^{2x^2} xy^2 dy dx \\ \int_0^1 \int_x^1 e^{-y^2} dy dx & \quad \int_0^2 \int_{y/2}^1 \sin\left(\frac{\pi}{2}x^2\right) dx dy & \quad \int_0^1 \int_{\sqrt{y}}^1 \sin(x^3) dx dy \end{aligned}$$

- Calcule os seguintes integrais duplos.

$$\begin{aligned} \iint_D x dx dy & \quad \text{onde } D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \text{ t.q. } 2 \leq x \leq 3 \text{ e } 1 \leq y \leq 10\}. \\ \iint_D e^{x+y} dx dy & \quad \text{onde } D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \text{ t.q. } 0 \leq x \leq 1 \text{ e } 0 \leq y \leq 1\}. \\ \iint_D (x + y) dx dy & \quad \text{onde } D \text{ é o triângulo de vértices } (0, 0), (0, 1), (1, 0). \\ \iint_D x^3 \cos(xy) dx dy & \quad \text{onde } D \text{ é a região limitada pelos gráficos de } y = x^2, y = 0, \text{ e } x = 2. \end{aligned}$$

2. **(coordenadas polares)** As coordenadas polares (ρ, θ) , com $\rho \in \mathbb{R}_+$ e $\theta \in [0, 2\pi[$, no plano estão definidas por

$$x = \rho \cos(\theta) \quad y = \rho \sin(\theta)$$

onde x e y são as coordenadas cartesianas. O elemento de área em coordenadas polares é $dx dy \simeq \rho d\rho d\theta$, ou seja,

$$\iint_R f(x, y) dx dy = \iint_R f(\rho \cos(\theta), \rho \sin(\theta)) \rho d\rho d\theta$$

- Calcule os seguintes integrais utilizando as coordenadas polares.

$$\iint_D \frac{1}{x^2 + y^2} dx dy \quad \text{onde } D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \text{ t.q. } 2 \leq x^2 + y^2 \leq 7\}.$$

$$\iint_D y dx dy \quad \text{onde } D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \text{ t.q. } x^2 + y^2 \leq 3\}$$

- Calcule o integral duplo

$$\iint_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)} dx dy$$

utilizando coordenadas polares, e deduza o valor do integral gaussiano $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx$.

3. (áreas) Esboce as seguintes regiões do plano e calcule as suas áreas recorrendo a um integral duplo.

- Círculo de raio r .
- Elipse $x^2 + y^2/9 = 1$.
- Região do plano definida por $-y^2 \leq x \leq y^2$ e $0 \leq y \leq 1$.
- Região do plano definida por $y \leq 4x - x^2$, $y \geq 0$ e $y \geq 6 - 3x$.
- Região do plano limitada pelas curvas $y = 4 - x^2$ e $y = x + 2$.
- Triângulo de vértices $(0, 0)$, $(1, 0)$ e $(2, 1)$.
- Região do plano limitada pela curva $\rho = \sin(\theta/2)$ com $0 \leq \theta \leq 2\pi$.

4. (volumes) Esboce os seguintes sólidos e calcule os seus volumes recorrendo a um integral duplo.

- Sólido limitado pelos planos coordenados e pelo plano $x + y + z = 1$.
- Sólido do primeiro octante limitado pelo cilindro $x^2 + z^2 = 9$ e pelos planos $x = 0$, $y = 0$, $z = 0$ e $x + 2y = 2$.
- Sólido limitado pelos planos $x = 0$, $x = 1$, $y = 0$, $y = 1$, $z = 0$, $z = 1$.
- Sólido limitado pelo plano $z = 0$, o cilindro $x^2 + y^2 = 1$ e o parabolóide $z = x^2 + y^2$.

5. (densidade e centro de massa) Se $\rho(x, y)$ denota a densidade de um corpo que ocupa a região planar $R \subset \mathbb{R}^2$, então a massa total do corpo é o integral duplo

$$M = \iint_R \rho(x, y) dx dy$$

O centro de massa é o ponto $\vec{p} = (\bar{x}, \bar{y})$, onde

$$\bar{x} = \frac{1}{M} \iint_R x \rho(x, y) dx dy \quad \bar{y} = \frac{1}{M} \iint_R y \rho(x, y) dx dy$$

- Determine o centro de massa do disco $(x - 1)^2 + y^2 \leq 1$ de densidade constante ρ .
- Determine a massa de um disco $x^2 + y^2 \leq 1$ com densidade $\rho(x, y) = 1 - x^2 - y^2$.
- Determine o centro de massa de um triângulo de vértices $(0, 0)$, $(2, 1)$ e $(0, 3)$, cuja densidade é $\rho(x, y) = x + y$.

Referências

[Apostol] Tom M. Apostol, *Calculus*, John Wiley & Sons, New York 1969.

10 Aproximação e análise qualitativa de modelos discretos

1. (**aproximação polinomial**) Se $f(x)$ é uma função $n+1$ vezes diferenciável numa vizinhança do ponto a , então vale a aproximação polinomial (de Taylor)

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + r_n(x)$$

onde o “resto” é

$$r_n(x) = \frac{1}{n!} \int_a^x (x-t)^n f^{(n+1)}(t) dt$$

Em particular, $r_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\bar{t})}{(n+1)!} (x-a)^{n+1}$ para algum ponto $\bar{t} \in [a, x]$, e portanto $\frac{r_n(x)}{|x-a|^n} \rightarrow 0$ quando $x \rightarrow a$.

- Prove as seguintes aproximações, validas para x suficientemente pequeno,

$$\begin{aligned} e^x &\simeq 1 + x + \frac{x^2}{2} + \dots & \log(1+x) &\simeq x - \frac{x^2}{2} + \dots \\ \sin(x) &\simeq x - \frac{x^3}{6} + \dots & \cos(x) &\simeq 1 - \frac{1}{2}x^2 + \dots \end{aligned}$$

- e determine estas outras

$$\begin{aligned} \frac{1}{1-x} &\simeq 1 + x + \dots & \sqrt{1+x} &\simeq 1 + \frac{1}{2}x + \dots \\ \log(1+x^2) &\simeq \dots & \sin(\pi e^{-x}) &\simeq \dots \end{aligned}$$

- Aproxime e , e estime o erro na sua aproximação, usando os polinómios de Taylor

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + r_n(x)$$

(observe que $1 \leq e^x \leq 3$ no intervalo $x \in [0, 1]$).

2. (**algoritmo de Heron**) Considere o problema de determinar o lado ℓ de um quadrado dada a sua área A , ou seja, o número $\ell = \sqrt{A}$.

Um método, utilizado provavelmente pelos babilónios e descrito por Heron¹⁰, consiste em construir recursivamente rectângulos de área A com lados cada vez mais próximos. Se x_1 e y_1 são a base e a altura do primeiro rectângulo, e portanto $x_1 y_1 = A$, então o segundo rectângulo tem como base a média aritmética de base e altura do primeiro, o terceiro rectângulo tem como base a média aritmética da base e a altura do segundo, e assim sucessivamente. A equação recursiva que determina as bases dos rectângulos é portanto

$$x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{A}{x_n} \right)$$

- Mostre que bases e alturas dos rectângulos verificam as equações recursivas

$$x_{n+1} = \frac{x_n + y_n}{2} \quad y_{n+1} = \frac{1/x_n + 1/y_n}{2}$$

- Calcule a diferença $x_{n+1} - y_{n+1}$ e mostre que

$$y_2 < y_3 < \dots < y_n < y_{n+1} < \dots < x_{n+1} < x_n < \dots < x_3 < x_2$$

e que

$$x_{n+1} - y_{n+1} < \frac{x_n - y_n}{2}$$

- Estime $\sqrt{2}$ com um erro < 0.01 e 0.001 .

¹⁰Carl B. Boyer, *A history of mathematics*, John Wiley & Sons, 1968. O. Neugebauer, *The exact sciences in antiquity*, Dover, 1969.

- Estime quantas iterações é preciso fazer para obter os primeiros n dígitos decimais de $\sqrt{2}$ usando o método dos babilônios.

3. (**Estabilidade dos estados estacionários**) Seja $\bar{x}$ um estado estacionário da equação recursiva

$$x_{n+1} = f(x_n)$$

ou seja, um ponto tal que $f(\bar{x}) = \bar{x}$. Se a transformação $f(x)$ é diferenciável, o princípio das contrações¹¹ permite decidir sobre a estabilidade do estado estacionário.

Se $|f'(\bar{x})| < 1$, então o ponto fixo é *atractivo*: as trajectórias de todo o ponto x_0 suficientemente próximo de $\bar{x}$ convergem para $\bar{x}$, ou seja $x_n \rightarrow \bar{x}$.

Se $|f'(\bar{x})| > 1$, então o ponto fixo é *repulsivo*: as trajectórias de todo o ponto $x_0 \neq \bar{x}$ numa vizinhança suficientemente pequena de $\bar{x}$ saem da vizinhança em tempo finito.

Se $f'(\bar{x}) = 0$, o ponto fixo $\bar{x}$ é dito *super-atractivo*¹².

- Estude a natureza dos pontos fixos das seguintes transformações

$$f(x) = \alpha x \quad f(x) = \alpha x^3 \quad f(x) = \alpha x + \beta x^2$$

ao variar os parâmetros.

- Digite 0.1 na sua máquina de calcular, e pressione repetidamente a tecla “cos”. O que acontece?
- Estude a natureza do ponto fixo não trivial do modelo logístico (exercício 2 da folha 2)

$$x_{n+1} = \lambda x_n(1 - x_n)$$

ao variar o parâmetro λ .

4. (**método de Newton**) O *método de Newton* para aproximar as raízes de um polinómio $P(z)$, ou seja, resolver a equação

$$P(z) = 0,$$

consiste em escolher uma primeira aproximação z_0 , e iterar

$$z_{n+1} = z_n - \frac{P(z_n)}{P'(z_n)}.$$

Ou seja, se z_0 é uma primeira conjectura, uma conjectura melhor é o zero da aproximação linear $P(z) \simeq P(z_0) + P'(z_0) \cdot (z - z_0)$.

- Mostre que se a sucessão (z_n) converge, i.e. $z_n \rightarrow z_\infty$, e se $P'(z_\infty) \neq 0$, então o limite z_∞ é um zero do polinómio. Mostre que, se a conjectura inicial z_0 está suficientemente próxima de uma raiz $\bar{z}$ e $P'(\bar{z}) \neq 0$, então a sucessão dos z_n converge para esta raiz.
- Verifique que o método de Newton aplicado ao polinómio quadrático $z^2 - a$, com $a > 0$, corresponde ao algoritmo de Heron!
- Escreva a receita do método de Newton para resolver $z^n - a = 0$, com $a > 0$ e $n \geq 2$.
- Utilize o método de Newton para estimar raízes de

$$z^2 + 1 + z \quad z^3 - z - 1 \quad z^5 + z + 1 \quad z^3 - 2z - 5$$

¹¹Se $f : I \rightarrow I$ é uma função diferenciável definida num intervalo fechado $I \subset \mathbb{R}$, e se $|f'(x)| \leq \lambda < 1$ para todo o $x \in I$, então f é dita *contração*, pois, pelo teorema do valor médio,

$$|f(x) - f(y)| \leq \lambda \cdot |x - y|$$

e $\lambda < 1$. O *princípio das contrações* afirma que então f tem um e um único *ponto fixo*, i.e. um ponto p tal que $f(p) = p$, e que a sucessão definida por

$$x_{n+1} = f(x_n)$$

a partir de uma condição inicial arbitrária $x_0 \in I$, converge para este ponto fixo, ou seja, $x_n \rightarrow p$ quando $n \rightarrow \infty$. A convergência é “exponencial”, pois

$$|x_n - p| \leq \lambda^n \cdot |x_0 - p|.$$

¹²Usando o polinómio de Taylor de grau 1 com resto, vê-se que, se x_0 está numa vizinhança suficientemente pequena de $\bar{x}$, então a trajectória de x_0 converge para o ponto fixo $\bar{x}$ e a velocidade de convergência é “quadrática”, ou seja,

$$|x_{n+1} - \bar{x}| \leq \beta \cdot |x_n - \bar{x}|^2$$

onde β é uma constante.

11 Simulações e sistemas de EDOs

1. (método de Euler) O método de Euler para simular as soluções da EDO

$$\dot{x} = v(t, x).$$

consiste em utilizar recursivamente a aproximação linear

$$x(t + dt) - x(t) \simeq v(t, x) \cdot dt,$$

dado um “passo” dt suficientemente pequeno. A solução $x(t_0 + n \cdot dt)$, com condição inicial $x(t_0) = x_0$, é estimada pela sucessão x_n definida recursivamente por

$$x_{n+1} = x_n + v(t_n, x_n) \cdot dt$$

onde $t_n = t_0 + n \cdot dt$. Numa linguagem como `c++` ou `Java`, o ciclo para obter uma aproximação de $x(t)$, dado $x(t_0) = \mathbf{x}$, é

```
while (time < t)
{
  x += v(time, x) * dt ;
  time += dt ;
}
```

- Considere a equação diferencial

$$\dot{x} = x$$

com condição inicial $x(0) = 1$. Mostre que, se o passo é $dt = \varepsilon$, então o método de Euler fornece a aproximação

$$x(t) \simeq (1 + \varepsilon)^n$$

onde $n \simeq t/\varepsilon$ é o número de passos. Deduza que, no limite quando o passo $\varepsilon \rightarrow 0$, as aproximações convergem para a solução verdadeira, pois

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} (1 + \varepsilon)^{t/\varepsilon} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{t}{n}\right)^n$$

Compare a resposta do método de Euler com a solução exacta $x(1) = e$, usando passos diferentes, por exemplo $\varepsilon = 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001 \dots$

2. (pêndulo matemático) Considere a equação de Newton que modela as oscilações de um pêndulo,

$$\ddot{\theta} = -\omega^2 \sin(\theta) - \alpha \dot{\theta}.$$

onde $\omega = \sqrt{g/\ell}$, g é a aceleração gravitacional, ℓ o comprimento do pêndulo, e $\alpha \geq 0$ um coeficiente de atrito. No espaço de fase, de coordenadas q e $p = \dot{q}$, a equação assume a forma do sistema

$$\begin{aligned} \dot{\theta} &= p \\ \dot{p} &= -\omega^2 \sin(\theta) - \alpha p \end{aligned}$$

- Simule o sistema, e esboce as trajectórias e as curvas de fase.

Retrato de fase do pêndulo (sem e com atrito).

3. (**oscilador harmónico**) As pequenas oscilações de um pêndulo em torno da posição de equilíbrio estável $\theta = 0$ são descritas pela equação do *oscilador harmónico*

$$\ddot{q} = -\omega^2 q.$$

onde ω é a frequência característica. No espaço de fase, de coordenadas q e $p = \dot{q}$, a equação assume a forma do sistema

$$\begin{aligned} \dot{q} &= p \\ \dot{p} &= -\omega^2 q \end{aligned}$$

- Simule o sistema, e esboce as trajetórias e as curvas de fase.
- Mostre que as trajetórias são

$$q(t) = A \sin(\omega t + \varphi) \quad \text{ou} \quad A \cos(\omega t + \phi),$$

onde a amplitude A e as fases φ e ϕ dependem dos dados iniciais $q(0) = q_0$ e $\dot{q}(0) = v_0$.

- Mostre que a energia

$$E(q, p) = \frac{1}{2}p^2 + \frac{1}{2}\omega^2 q^2$$

é uma constante do movimento, ou seja que se $(q(t), p(t))$ é uma solução do oscilador harmónico então $\frac{d}{dt}E(q(t), p(t)) = 0$ para todo o tempo t .

Retrato de fase do oscilador harmónico.

4. (**oscilações amortecidas**) Considere a equação das *oscilações amortecidas*

$$\ddot{q} = -2\alpha\dot{q} - \omega^2 q,$$

onde $\alpha > 0$ é um coeficiente de atrito.

- Simule o sistema quando $\alpha^2 < \omega^2$ (amortecimento sub-crítico), $\alpha^2 = \omega^2$ (amortecimento crítico), e $\alpha^2 > \omega^2$ (amortecimento super-crítico).

Retrato de fase e trajetórias do oscilador amortecido (sub-crítico e super-crítico).

5. (**oscilações forçadas**) Considere a equação das *oscilações forçadas amortecidas*

$$\ddot{q} = -2\alpha\dot{q} - \omega^2q + F(t),$$

onde $\alpha \geq 0$ é um coeficiente de atrito e $F(t)$ uma força.

- Simule o sistema quando a força é $F(t) = F_0 \cos(\gamma t)$, ao variar os parâmetros.

6. (**circuito LRC**) A corrente $I(t)$ num circuito RLC, de resistência R , indutância L e capacidade C , é determinada pela EDO

$$L\ddot{I} + R\dot{I} + \frac{1}{C}I = \dot{V},$$

onde $V(t)$ é a tensão que alimenta o circuito.

- Simule a corrente num circuito alimentado com uma tensão constante $V(t) = V_0$.
- Simule a corrente num circuito alimentado com uma tensão alternada $V(t) = V_0 \sin(\gamma t)$ (compare com a equação das oscilações forçadas amortecidas).

7. (**oscilador de van der Pol**) Considere o *oscilador de van der Pol*¹³

$$\ddot{q} - \mu(1 - q^2)\dot{q} + q = 0$$

que modela a corrente num circuito com um elemento não-linear.

- Simule o sistema e discuta o comportamento das soluções ao variar o parâmetro μ .

Retrato de fase e trajectórias do oscilador de van der Pol.

- Simule o oscilador forçado

$$\ddot{q} - \mu(1 - q^2)\dot{q} + q = F_0 \sin(\omega t)$$

ao variar o parâmetro μ e a frequência ω .

8. (**sistema de Lotka-Volterra**) Considere o *sistema de Lotka-Volterra*

$$\begin{aligned} \dot{x} &= ax - bxy \\ \dot{y} &= -cy + dxy \end{aligned}$$

Foi proposto por Vito Volterra¹⁴ para modelar a competição entre x presas e y predadores, e por Alfred J. Lotka¹⁵ para modelar o comportamento cíclico de certas reacções químicas, como o esquema abstracto

- Determine as soluções estacionárias.

¹³B. van der Pol, A theory of the amplitude of free and forced triode vibrations, *Radio Review* **1** (1920), 701-710 and 754-762. B. van der Pol and J. van der Mark, Frequency demultiplication, *Nature* **120** (1927), 363-364.

¹⁴Vito Volterra, Variazioni e fluttuazioni del numero d'individui in specie di animali conviventi, *Mem. Acad. Lincei* **2** (1926), 31-113. Vito Volterra, *Leçons sur la Théorie Mathématique de la Lutte pour la Vie*, Paris 1931.

¹⁵Alfred J. Lotka, *J. Amer. Chem. Soc* **27** (1920), 1595. Alfred J. Lotka, *Elements of physical biology*, Williams & Wilkins Co. 1925.

- Mostre que a função

$$H(x, y) = dx + by - c \log x - a \log y$$

é uma constante do movimento, ou seja, $\frac{d}{dt}H(x(t), y(t)) = 0$. Deduza que as órbitas do sistema estão contidas nas curvas de nível de $H(x, y)$.

- Simule o sistema.

Retrato de fase do sistema de Lotka-Volterra.

9. (Brusselator) O *Brusselator* é um modelo autocatalítico proposto por Ilya Prigogine e colaboradores¹⁶ que consiste na reacção abstracta

- Simule o sistema

$$\begin{aligned} \dot{x} &= \alpha - (\beta + 1)x + x^2y \\ \dot{y} &= \beta x - x^2y \end{aligned}$$

para as concentrações das espécies catalíticas X e Y , obtido quando as concentrações $[A] \sim \alpha$ e $[B] \sim \beta$ são mantidas constantes.

- Simule o sistema

$$\begin{aligned} \dot{x} &= \alpha - (b + 1)x + x^2y \\ \dot{y} &= bx - x^2y \\ \dot{b} &= -bx + \delta \end{aligned}$$

para as concentrações de X , Y e B , obtido quando a concentração $[A] \sim \alpha$ é mantida constante e B é injectado a uma velocidade constante $v \sim \delta$.

Retrato de fase do Brusselator.

10. (bifurcação de Hopf) Considere o sistema¹⁷

$$\begin{aligned} \dot{x} &= -y + x(\lambda - (x^2 + y^2)) \\ \dot{y} &= x + y(\lambda - (x^2 + y^2)) \end{aligned}$$

¹⁶I. Prigogine and R. Lefever, Symmetry breaking instabilities in dissipative systems, *J. Chem. Phys.* **48** (1968), 1655-1700. P. Glansdorff and I. Prigogine, *Thermodynamic theory of structure, stability and fluctuations*, Wiley, New York 1971. G. Nicolis and I. Prigogine, *Self-organization in non-equilibrium chemical systems*, Wiley, New York 1977.

¹⁷E. Hopf, Abzweigung einer periodischen Lösung von einer stationären Lösung eines differentialsystem, *Ber. Verh. Sächs. Acad. Wiss. Leipzig Math. Phys.* **95** (1943), 3-22.

- Simule o sistema ao variar o parâmetro λ .
- Mostre que a origem é um equilíbrio assintoticamente estável quando $\lambda < 0$.
- Mostre que a origem é um equilíbrio instável quando $\lambda > 0$. Observe que a circunferência $x^2 + y^2 = 1$ é um “ciclo limite” do sistema quando $\lambda = 1$.
- Simule o sistema

$$\begin{aligned}\dot{x} &= x + y - x(\lambda - (x^2 + y^2)) \\ \dot{y} &= -x + y - y(\lambda - (x^2 + y^2))\end{aligned}$$

11. (reação de Schnakenberg) Considere a reação de Schnakenberg¹⁸

modelada pelo sistema

$$\begin{aligned}\dot{x} &= x^2y - x + \beta \\ \dot{y} &= -x^2y + \alpha\end{aligned}$$

para as concentrações $x \sim [X]$ e $y \sim [Y]$.

- Simule o sistema e discuta o comportamento das soluções ao variar so parâmetros.

Retrato de fase do sistema de Schnakenberg.

12. (oscilador bioquímico de Goodwin) Um modelo de interações proteínas-mRNA proposto por Goodwin¹⁹ é

$$\begin{aligned}\dot{M} &= \frac{1}{1+P} - \alpha \\ \dot{P} &= M - \beta\end{aligned}$$

onde M e P denotam as concentrações relativas de mRNA e proteína, respectivamente.

- Simule o sistema e discuta o comportamento das soluções ao variar so parâmetros.

Retrato de fase do sistema de Goodwin.

¹⁸J. Schnakenberg, Simple chemical reaction with limit cycle behavior, *J. Theor. Biol.* **81** (1979), 389-400.

¹⁹B.C. Goodwin, *Temporal organization in cells*, Academic Press, London/New York 1963. B.C. Goodwin, Oscillatory behaviour in enzymatic control processes, *Adv. Enzyme Regul.* **3** (1965), 425-438.

- Simule o sistema²⁰

$$\begin{aligned}\dot{M} &= \frac{1}{1+P^n} - \alpha M \\ \dot{P} &= M^m - \beta P\end{aligned}$$

13. (atractor de Lorenz) Considere o sistema de Lorenz²¹

$$\begin{aligned}\dot{x} &= \sigma(y - x) \\ \dot{y} &= x(\rho - z) - y \\ \dot{z} &= xy - \beta z\end{aligned}$$

- Analize o comportamento assintótico das trajetórias ao variar os parâmetros σ , ρ e β .
- Observe o comportamento das trajetórias quando $\sigma \simeq 10$, $\rho \simeq 28$ e $\beta \simeq 8/3$.

Atrator de Lorenz.

²⁰T. Scheper, D. Klinkenberg, C. Pennartz and J. van Pelt, A Mathematical Model for the Intracellular Cicardian Rhythm Generator, *J. Neuroscience* **19** (1999), 40-47.

²¹E.N. Lorenz, Deterministic nonperiodic flow, *J. Atmospheric Science* **20** (1963), 130-141.