

NomeNº ENGFIS
 FIS

Instruções: responda e justifique brevemente as suas respostas nesta folha; se necessário, utilize uma folha de exame para apresentar mais cálculos.

1. (2 valores) Determine a solução geral (ou seja, todas as soluções) da equação diferencial linear homogénea $\ddot{x} + 2\dot{x} + 2x = 0$.

$$x(t) = ae^{-t} \cos(t) + be^{-t} \sin(t), \quad \text{com } a, b \in \mathbb{R}.$$

2. (2 valores) Determine a solução da equação diferencial linear homogénea $\ddot{x} + 2\dot{x} + 2x = 0$ com condições iniciais $x(0) = -1$ e $\dot{x}(0) = 1$.

$$x(t) = -e^{-t} \cos(t).$$

3. (2 valores) Determine uma (ou seja, apenas uma) solução da equação diferencial linear não homogénea $\ddot{x} + 9x = \cos(3t)$.

$$x(t) = \frac{1}{6} t \sin(3t).$$

4. (2 valores) Seja \mathbf{E} o espaço linear real das funções $f : [0, \pi] \rightarrow [0, \pi]$ infinitamente diferenciáveis e tais que $f(0) = f(\pi) = 0$, e seja $D : \mathbf{E} \rightarrow \mathbf{E}$ o operador linear definido por $(Df)(t) := f'(t)$. Determine valores e vetores próprios de $\Delta = D^2$.

$$\lambda_n = -n^2 \quad \text{e} \quad f_n(t) = \sin(nt), \quad \text{com } n = 1, 2, 3, \dots$$

5. (2 valores) Seja $R : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ a reflexão na reta $y = \sqrt{3}x$. Determine valores e vetores próprios de R .

$$\lambda_{\pm} = \pm 1 \quad \text{e} \quad v_+ = (1, \sqrt{3}), \quad v_- = (\sqrt{3}, -1).$$

6. (2 valores) Seja $R : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ a reflexão na reta $y = \sqrt{3}x$. Determine a matriz que representa R na base canónica.

$$\begin{pmatrix} -1/2 & \sqrt{3}/2 \\ \sqrt{3}/2 & 1/2 \end{pmatrix}$$

7. (2 valores) Seja $L : \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$ um operador linear hermitiano (auto-adjunto). Prove que os valores próprios de L são reais.

Se $L^* = L$ e $Lv = \lambda v$ com $v \neq 0$, então

$$\lambda \|v\|^2 = \langle \lambda v, v \rangle = \langle Lv, v \rangle = \langle v, Lv \rangle = \langle v, \lambda v \rangle = \bar{\lambda} \|v\|^2,$$

e portanto $\lambda = \bar{\lambda}$.

8. (2 valores) Sejam A e B duas matrizes $n \times n$ complexas. Prove a seguinte afirmação ou apresente um contra exemplo: se A e AB são unitárias então também B é unitária.

Se $A^* = A^{-1}$ e $(AB)^* = (AB)^{-1}$, então

$$I = (AB)^*(AB) = B^*A^*AB = B^*B$$

9. (2 valores) Diagonalize (ou seja, determine uma matriz diagonal Λ e uma matriz invertível U tais que $\Lambda = U^{-1}CU$) a matriz complexa

$$C = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix},$$

$$\Lambda = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad U = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & i \\ i & 1 \end{pmatrix}$$

10. (2 valores) Dê exemplos não triviais (ou seja, diferentes da identidade) de uma transformação linear ortogonal $O : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ e de uma transformação linear unitária $U : \mathbb{C}^2 \rightarrow \mathbb{C}^2$.

$$O(x, y) = (x, -y) \quad \text{e} \quad U(z, w) = (iz, iw)$$

NomeNº ENGFIS FIS

Instruções: responda e justifique brevemente as suas respostas nesta folha; se necessário, utilize uma folha de exame para apresentar mais cálculos.

1. (2 valores) Identifique a matriz simétrica da forma quadrática


$$Q(x, y) = 2x^2 + 5y^2 + 4xy,$$

determine os seus valores próprios e uma matriz ortogonal diagonalizadora.

$$\begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} = U \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix} U^T \quad \text{onde} \quad U = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

2. (2 valores) Identifique e esboce a cónica definida pela equação cartesiana

$$2x^2 + 5y^2 + 4xy - 1 = 0.$$



3. (2 valores) Determine, se existirem, umas matrizes reais A e B tais que

$$A^2 = - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad e^B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Por exemplo

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

e B não pode existir, porque $\det(e^B) = e^{\text{tr}B} > 0$

4. (2 valores) Determine a matriz de uma rotação de um ângulo $\pi/4$ em torno do eixo x do espaço euclidiano \mathbb{R}^3 .

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \\ 0 & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}$$

5. (2 valores) Mostre que se A é uma matriz real anti-simétrica (ou seja, tal que $A^T = -A$), então e^A é ortogonal.

$$(e^A)^T = e^{A^T} = e^{-A} = (e^A)^{-1}$$


6. (2 valores) Calcule o grupo a um parâmetro das matrizes $G(t) = e^{tA}$, com $t \in \mathbb{R}$, gerado pela matriz

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$e^{tA} = e^{-t} \begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

7. (2 valores) Esboce o retrato de fase (ou seja, algumas órbitas) do sistema de EDOs

$$\begin{aligned}\dot{x} &= -2x + 5y \\ \dot{y} &= -x + 3y\end{aligned}$$



8. (2 valores) Determine a solução com condições iniciais $(x(0), y(0)) = (2, 1)$ do sistema de EDOs

$$\begin{aligned}\dot{x} &= x + y \\ \dot{y} &= y - x\end{aligned}$$

$$\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = e^t \begin{pmatrix} \cos(t) & \sin(t) \\ -\sin(t) & \cos(t) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

9. (2 valores) Determine a solução (ou, pelo menos, uma fórmula integral para a solução) com condições iniciais $(q(0), p(0)) = (0, 0)$ do sistema não homogêneo

$$\begin{aligned}\dot{q} &= -q + p \\ \dot{p} &= -p + t\end{aligned}$$

$$\begin{pmatrix} q(t) \\ p(t) \end{pmatrix} = e^{-t} \begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \left(\int_0^t \begin{pmatrix} e^s & -s e^s \\ 0 & e^s \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ s \end{pmatrix} ds \right)$$

10. (2 valores) Determine a solução geral da equação diferencial homogênea

$$\ddot{x} + x = 0$$

$$x(t) = a e^{-t} + b e^{t/2} \cos(\sqrt{3}t/2) + c e^{t/2} \sin(\sqrt{3}t/2)$$